

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

### IDENTIFICACIÓN

46-51 cm. En plumaje **nupcial** con dorso oscuro; partes inferiores blancas; con dos moños oscuros y dos golas rojizas. En plumaje **no nupcial** con colores más apagados; sin golas y con los moños mucho menores.

### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño puede ser de ayuda en ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 205 mm, pico con longitud mayor de 60 mm; **hembra** con ala menor de 175 mm; pico con longitud menor de 60 mm.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas del dorso y algunas coberturas del ala. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** donde adquieren el plumaje de cortejo.

### EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

**Juveniles** con restos de estriado marrón y de plumón en la cabeza; secundarias grises; barba interna de las grandes coberturas gris; iris naranja con estrecho anillo amarillo.

**1º invierno** con aspecto similar al **adulto** en **invierno** pero escapulares con restos de plumón en las puntas; con secundarias grises y barba interna de las coberturas externas gris oscuro, a veces con un borde blanco; parte posterior del tarso sólo ligeramente aserrado.

**2º año primavera** con plumas de vuelo y grandes coberturas externas con diseño **juvenil**; adornos de la cabeza poco desarrollados; parte posterior del tarso ligeramente aserrado.

**Adulto** en cualquier plumaje con secundarias blancas; barba interna de las grandes coberturas externas de color blanco puro; escapulares sin restos de plumón en las puntas; iris rojo con estrecho anillo naranja; parte posterior del tarso fuertemente aserrado. En plumaje **nupcial** con adornos de la cabeza bien desarrollados

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                      ■ En paso