

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí



Zampullín común. Verano. Macho (08-VIII).

ZAMPULLÍN COMÚN (*Tachybaptus ruficollis*)

IDENTIFICACIÓN

25-29 cm. En plumaje **nupcial** de color pardo oscuro, con la cara y el cuello castaños; base del pico con una mancha clara. En **invierno** y **juveniles** de color claro, pardos por encima y casi blancos por debajo; sin mancha clara en la base del pico.



Zampullín común. Diseño de la cabeza: arriba verano; abajo invierno (Foto: Ottenby Bird Observatory)

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar si acaso en, **plumaje nupcial**, las **hembras** son habitualmente más apagadas que los **machos**. (**CAUIDADO**: la intensidad en la coloración del plumaje no siempre es un carácter útil). En aves **adultas**, el tamaño puede separar ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 102 mm; **hembra** con ala menor de 95 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con restos del diseño de los pollos (rayado marrón o blanco) a los lados de la cabeza y cuello; mejillas de color ante; iris oscuro; pico anaranjado.

1º año invierno con aspecto similar al **adulto** en **invierno**, pero fácilmente reconocible si conserva plumón **juvenil** en el dorso o restos del diseño rayado o manchas claras en la cabeza y lados del cuello; iris rojizo apagado; punta de las primarias externas estrecha.

2º año primavera similar al **adulto**, pero con la punta de las primarias externas **juveniles** estrecha.

Adulto con iris rojizo; punta de las primarias externas ancha y redondeada; en **verano** con pico negro.



Zampullín común. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial, reducida a la cabeza y plumas corporales, terminada entre agosto y noviembre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial cambiando las plumas corporales para adquirir el plumaje nupcial.

ESPECIES SIMILARES

Su tamaño pequeño, los colores ocres y la ausencia de adornos faciales hacen a este zampullín inconfundible.

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, con aporte de aves europeas en invierno. Nidifica en puntos de agua dulce con buen desarrollo de vegetación palustre en el Valle del Ebro y Gallo-canta.



Zampullín común. Verano. Hembra (08-VIII).



Zampullín común. Verano. Juvenil (18-VII).



Zampullín común. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (08-VIII); arriba derecha hembra (08-VIII); izquierda juvenil (18-VII).

Zampullín común. Verano. Diseño de la cabeza: arriba macho (08-VIII); centro hembra (08-VIII); abajo juvenil (18-VII).

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí



Zampullín común. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (08-VIII); arriba derecha hembra (08-VIII); izquierda juvenil (18-VII).



Zampullín común. Verano. 2º año: diseño de secundarias (08-VIII).



Zampullín común. Verano. Juvenil: diseño de secundarias (18-VII).



Zampullín común. Verano. Adulto: diseño de secundarias (08-VIII).



Zampullín común. Verano. Adulto: diseño de coberteras primarias (08-VIII).

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí



Zampullín común. Verano. 2º año: diseño de coberteras primarias (08-VIII).



Zampullín común. Verano. 2º año: diseño de primarias (08-VIII).



Zampullín común. Verano. Juvenil: diseño de coberteras primarias (18-VII).



Zampullín común. Verano. Juvenil: diseño de primarias (18-VII).



Zampullín común. Verano. Adulto: diseño de primarias (08-VIII).



Zampullín común. Verano. Adulto: diseño del ala (08-VIII).



Zampullín común. Verano. 2º año: diseño del ala (08-VIII).

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí




Zampullín común. Verano. Juvenil: diseño del ala (18-VII).



Zampullín común. Invierno. Diseño de la cabeza: arriba adulto (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory); abajo 1º año (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).




Zampullín común. Invierno. Adulto (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. Diseño del pecho: izquierda adulto (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 1º año (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. 1º año (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Zampullín común. Invierno. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 1º año (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí



Zampullín común. Invierno. Adulto: diseño de coberteras primarias (08-I).



Zampullín común. Invierno. 1º año: diseño de secundarias (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. 1º año: diseño de coberteras primarias (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. Adulto: diseño de primarias (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. Adulto: diseño de secundarias (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. 1º año: diseño de primarias (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).

05 Zampullín común

Pon tu logo aquí



Zampullín común. Invierno. Adulto: diseño del ala (26-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Zampullín común. Invierno. 1º año: diseño del ala (30-X) (Foto: Ottenby Bird Observatory).