

IDENTIFICACIÓN

70-80 cm. Partes superiores pardas, con tinte dorado y fuertemente rayadas; partes inferiores pardo amarillentas; capirote y bigoterías negras; pico amarillo verdoso.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación. El tamaño puede ser un carácter útil: **macho** con ala mayor de 335 mm; **hembra** con ala menor de 327 mm. Sólo en **periodo nupcial**, **macho** con la parte desnuda entre el pico y el ojo de color azulado; **hembra** con la parte desnuda entre el pico y el ojo de color verdoso-marrón.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con diseño similar al **adulto** pero con plumas de cola y de vuelo con una sola generación; primaria externa estrecha y puntiaguda; iris uniformemente oliva-amarillo apagado.

1º año otoño/2º año primavera similar al **adulto**; reconocible mientras tenga en alas y cola una sola generación de plumas; si hay dos generaciones de plumas de vuelo entonces con iris de diseño juvenil (oliva-amarillo con tinte anaranjado en la parte exterior del ojo).

Adulto con tres generaciones de plumas de vuelo; iris uniformemente teñido de naranja o rojo, más oscuro que en los **juveniles**, a veces uniformemente marrón; primaria externa ancha y con punta redondeada.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele durar todo el otoño (hasta enero). Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas corporales; algunos ejemplares pueden cambiar también coberteras del ala, cola, escapulares o plumas de vuelo; generalmente terminada en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso