

01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto (26-VII).

IDENTIFICACIÓN

45-52 cm. Plumaje casi totalmente blanco, con manchas ocreas en el púleo, pecho y dorso en época **nupcial**, que se atenúan en **invierno**; patas, pico y ojos anaranjados en época **nupcial**, patas verde oscuro y pico y ojos amarillos el resto del año; los **juveniles** blanco puro sin manchas y patas oscuras.



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de cabeza y pecho.



Garcilla bueyera. Invierno. Diseño de cabeza y pecho.

ESPECIES SIMILARES

Entre las garzas blancas de tamaño similar, podría existir confusión con la **garceta común**, que es siempre blanco puro, tienen el pico oscuro y las patas oscuras con dedos amarillos.



Garceta común

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño puede ayudar sólo en algunos **machos** extremos con ala mayor de 260 mm. **CUIDADO:** los ejemplares con ala menor de 260 mm pueden ser de ambos sexos indistintamente.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil/1º año otoño con plumaje totalmente blanco, incluido el púleo; patas negras que se vuelven verde oscuro.

2º año primavera a veces con plumas del pecho y escapulares muy reducidas y poco coloreadas de ante; si se han retenido, entonces primarias externas y secundarias centrales **juveniles** desgastadas y puntiagudas.

2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejemplares que hayan retenido alguna primaria externa o secundaria central **juvenil**, que estarán muy blanqueadas y desgastadas.

Adulto en plumaje **nupcial** con ante en púleo, pecho, dorso y escapulares; en plumaje **no nupcial** blancos con plumas ante en la parte superior del pecho y manto.



Garcilla bueyera. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 1º año.

FOTO NO DISPONIBLE

01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Primavera. Determinación de la edad. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año; izquierda juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo el pileo (toma el color ante unos 5 meses después de nacer) y plumas del cuerpo. De febrero a abril, existe una muda **prenupcial** reducida a la adquisición de las plumas ornamentales en **adultos**. Los ejemplares de **2º año** tienen una muda variable cambiando las plumas ornamentales, todo o parte del plumaje corporal y todas o parte de las plumas de vuelo y cola.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (26-VII); centro 2º año (); abajo juvenil (26-VII).



01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda en otoño (03-X); arriba derecha adulto en Primavera (26-VII); izquierda juvenil (26-VII).



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la nuca: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).

01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)



FOTO NO DISPONIBLE

Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de las patas: arriba adulto (26-VII); centro 2º año (); abajo juvenil (26-VII).



FOTO NO DISPONIBLE



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de primarias (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de primarias ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (26-VII).




Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de secundarias ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño del ala (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño del ala ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño del ala (26-VII).

01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)




Garcilla bueyera. Otoño. Adulto (05-XI).




Garcilla bueyera. Otoño. 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (05-XI); abajo 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del píleo: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de la nuca: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().

01110 **Garcilla bueyera** (*Bubulcus ibis*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de primarias (05-XI).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de primarias ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (05-XI); abajo 1º año ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (05-XI).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de secundarias ().



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño del ala (05-XI).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño del ala ().