



Gavilán común. Adulto. Macho (28-XII)

IDENTIFICACIÓN

Macho: 28-34 cm; **hembra:** 33-42 cm. Alas cortas y redondeadas y cola larga; ojos amarillos o anaranjados; cola con 4-5 bandas oscuras estrechas y una subterminal ancha; partes superiores gris-ceniza en **adultos**, amarronadas en **juveniles**; partes inferiores ondeadas de pardo-rojizo en el **macho**, pardo oscuro en la **hembra** y **juveniles**.



Gavilán común. Diseño de la cola y la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

ESPECIES SIMILARES

Los **cernícalos vulgar** y **primilla** tienen la cola larga, pero sus ojos son oscuros y el dorso es pardo; el **alcotán** y el macho de **esmerejón** tienen el dorso ojos oscuros; la hembra de **gavilán** puede confundirse gris, pero sus alas son puntiagudas y tienen los con un macho de **azor**, que son siempre mayores (ala mayor de 289 mm.); los juveniles de **azor** tienen las partes inferiores moteadas.



Cernícalo vulgar



Alcotán



Esmerejón



Azor. Juvenil y adulto.

SEXO

En **adultos, macho** con la lista superciliar blanca poco marcada o ausente; dorso gris-azulado uniforme; partes inferiores barradas de ante-naranja; ojo naranja intenso, a veces rojizo; ala menor de 212 mm., tarso menor de 55 mm. **Hembra** con lista superciliar blanca bien marcada; partes superiores varían del gris al marrón; partes inferiores habitualmente barradas de marrón-gris, pero a veces con tinte ocre; iris amarillo pero a veces naranja claro en los ejemplares más viejos; ala mayor de 217 mm, tarso mayor de 59 mm. **Juveniles** con plumaje similar en ambos sexos, pero se pueden sexar por el tamaño del ala y del tarso.



Gavilán común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Gavilán común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Gavilán común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del dorso: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra con dorso gris; izquierda hembra con dorso marrón.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumas del dorso y coberteras alares marrón oscuro con margen leonado o ante (que llega a desaparecer por desgaste); partes inferiores claras con plumas barradas con un “diseño acorazonado” de color ocre en la punta; secundarias con barra subterminal oscura estrecha; iris amarillo claro; en **primavera** pueden tener algunas plumas cambiadas en nuca y dorso, que son grises y sin borde ocre.

2º año otoño/3º año primavera solo si han retenido plumas **juveniles**, de color marrón oscuro y borde ante, en escapulares, obispillo y pequeñas coberteras del ala; a veces plumas de la cola y secundarias retenidas también.

Adulto con plumas del dorso y coberteras alares sin margen leonado; partes inferiores blancas o con tinte rojizo uniformemente barradas; secundarias con barra subterminal oscura ancha; iris amarillo intenso o naranja.

CUIDADO: en los ejemplares con plumas corporales, de la cola o secundarias retenidas será necesario saber si las plumas viejas son de tipo **adulto** o **juvenil** para asignar correctamente la edad.



Gavilán común. Determinación de la edad. Diseño de las plumas del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Gavilán común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa pero algunos ejemplares pueden retener plumas corporales, de la cola y secundarias; generalmente terminada en octubre. La muda **postjuvenil** comienza en el **2º año** y es completa, aunque algunas plumas **juveniles** pueden ser retenidas en el obispillo, cola, secundarias y coberturas del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Gavilán común. Adulto. Hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Macho (30-XII)



Gavilán común. 2º año. Hembra (30-XII)

02690 Gavilán común (*Accipiter nisus*)



Gavilán común. Juvenil. Macho (10-I)



Gavilán común. Juvenil. Hembra (26-I)



Gavilán común. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (28-XII); abajo hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XII); abajo hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (10-I); abajo hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).

02690 Gavilán común (*Accipiter nisus*)



Gavilán común. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño del obispillo: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño de las coberturas primarias: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño de las coberturas primarias: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).




Gavilán común. Juvenil. Diseño de las coberturas primarias: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño de las coberturas del ala: arriba macho (28-XII); abajo hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño de las coberturas del ala: arriba macho (30-XII); abajo hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño de las coberturas del ala: arriba macho (10-I); abajo hembra (26-I).





Gavilán común. Adulto. Macho: diseño de primarias (28-XII)

Gavilán común. 2º año. Macho: diseño de primarias (30-XII)



Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (10-XI)

Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño de primarias (30-XII)



Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño de primarias (10-I)



Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (26-I)



Gavilán común. Adulto. Macho: diseño de secundarias (28-XII).



Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Macho: diseño de secundarias (30-XII).



Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (10-I).



Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (26-I).



Gavilán común. Adulto. Macho: diseño del ala (28-XII).



Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-11).



Gavilán común. 2º año. Macho: diseño del ala (30-XII).



Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño del ala (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño del ala (10-11).



Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño del ala (26-1)

