

39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto (26-VII).



Garceta común

GARCILLA BUEYERA (*Bubulcus ibis*)

IDENTIFICACIÓN

45-52 cm. Plumaje casi totalmente blanco, con manchas ocre en el píleo, pecho y dorso en época **nupcial**, que se atenúan en **invierno**; patas, pico y ojos anaranjados en época **nupcial**, patas verde oscuro y pico y ojos amarillos el resto del año; los **juveniles** blanco puro sin manchas y patas oscuras.



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de cabeza y pecho.



Garcilla bueyera. Invierno. Diseño de cabeza y pecho.

ESPECIES SIMILARES

Entre las garzas blancas de tamaño similar, podría existir confusión con la **garceta común**, que es siempre blanco puro, tienen el pico oscuro y las patas oscuras con dedos amarillos.

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño puede ayudar sólo en algunos **machos** extremos con ala mayor de 260 mm. **CUIDADO:** los ejemplares con ala menor de 260 mm pueden ser de ambos sexos indistintamente.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil/1º año otoño con plumaje totalmente blanco, incluido el píleo; patas negras que se vuelven verde oscuro.

2º año primavera a veces con plumas del pecho y escapulares muy reducidas y poco coloreadas de ante; si se han retenido, entonces primarias externas y secundarias centrales **juveniles** desgastadas y puntiagudas.

2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejemplares que hayan retenido alguna primaria externa o secundaria central **juvenil**, que estarán muy blanqueadas y desgastadas.

Adulto en plumaje **nupcial** con ante en píleo, pecho, dorso y escapulares; en plumaje **no nupcial** blancos con plumas ante en la parte superior del pecho y manto.



Garcilla bueyera. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 1º año.



39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Primavera. Determinación de la edad. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año; izquierda juvenil.

Garcilla bueyera. Primavera. 2º año ().

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo el púleo (toma el color ante unos 5 meses después de nacer) y plumas del cuerpo. De febrero a abril, existe una muda **prenupcial** reducida a la adquisición de las plumas ornamentales en **adultos**. Los ejemplares de **2º año** tienen una muda variable cambiando las plumas ornamentales, todo o parte del plumaje corporal y todas o parte de las plumas de vuelo y cola.



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil (26-VII).

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Muy localizada como reproductora en puntos de la Depresión del Ebro. En invierno, extendida por zonas con implantación de regadío.



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (26-VII); centro 2º año (); abajo juvenil (26-VII).



39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda en otoño (03-X); arriba derecha adulto en Primavera (26-VII); izquierda juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).




Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la nuca: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).

39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de las patas: arriba adulto (26-VII); centro 2º año (); abajo juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (26-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de primarias (26-VII).

39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de primarias ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño del ala (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño del ala ().



Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño del ala (26-VII).



Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de secundarias ().

39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto (05-XI).



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del píleo: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de la nuca: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (05-XI); abajo 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().

39 Garcilla bueyera

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de primarias (05-XI).

Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (05-XI); derecha 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de primarias ().



Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (05-XI); abajo 1º año ().



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (05-XI).

39 **Garcilla bueyera**

Pon tu logo aquí



Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de secundarias ().



Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño del ala (05-XI).



Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño del ala ().