

**FOTO NO DISPONIBLE**

Sisón común. Macho nupcial (bb-nn)

**IDENTIFICACIÓN**

41-43 cm. En plumaje **nupcial**, el **macho** tiene el capirote ocre con estriado negro y resto de la cabeza gris; cuello negro con listado blanco, seguido de un collar blanco y otro negro. En plumaje **no nupcial**, similar a la **hembra**: dorso y coberteras alares ocre con fino barreado negro; partes inferiores blancas; alas con plumas de vuelo blancas con punta negra; pico gris con punta negra y patas verdosas o grises.

**ESPECIES SIMILARES**

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

**SEXO**

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible por el diseño negro del cuello; en periodo **no nupcial**, **macho** con dorso regularmente vermiculado y claro; partes inferiores sin moteado oscuro; lados del pecho vermiculados como el dorso; a veces un difuso semicollar ante pálido; 7ª primaria corta. **Hembra** con dorso con vermiculado poco regular y oscuro; partes inferiores blancas, con moteado oscuro en el pecho, flancos e infracoberteras laterales de la cola; 7ª primaria larga. Los **juveniles** no se pueden sexar hasta su **2º año**, en que los **machos** adquieren algunas plumas negras en el cuello en periodo nupcial.

**EDAD**

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

**Juveniles** con el aspecto de la **hembra** pero con cabeza más estriada y dorso más oscuro; coberteras del ala barreadas de sepia; primarias cortas y puntiagudas, con mancha sepia en las barbas externas; primarias y secundarias internas con marcas oscuras subterminales; plumas de la cola puntiagudas sin punta blanca; iris marrón o gris; pico gris con base amarillenta.

**1º año otoño/2º año primavera** se reconocen por las primarias externas retenidas y plumas **juveniles** retenidas en coberteras del ala y cuerpo.

**2º año otoño/3º año primavera** sólo en algunos ejemplares que llegan a retener la 10ª primaria **juvenil**.

**Adultos** con las plumas del ala de la misma generación; primarias de punta redondeada, blanco puro con ancha banda negra subterminal; plumas de la cola redondeadas con punta blanca; iris amarillo, rojizo en época nupcial; pico gris con punta negra.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, entre mayo y finales de septiembre; la muda **prenupcial** en adultos es parcial y abarca plumas del cuerpo y cuello. La muda **postjuvenil** es parcial cambiando, hasta diciembre, las plumas corporales y coberteras del ala, reteniendo algunas; la muda **prenupcial** en primavera quita todas las coberteras y plumas corporales **juveniles** alcanzando a parte de las plumas de vuelo; todo el plumaje se cambia en su primera muda **postnupcial**, dejando algunos raros ejemplares la 10ª primaria **juvenil** sin mudar un año más.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Invernante

■ Residente

■ En paso



Sisión común. Macho no nupcial (bb-nn)



Sisión común. Hembra (bb-nn)



Sisión común. Juvenil (bb-nn)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**




**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Macho. Diseño de la cabeza: arriba izquierda nupcial (nn-xx); arriba derecha no nupcial (06-VIII); izquierda 2º año (bb-xx).




**FOTO NO DISPONIBLE**

Sisión común. Diseño de la cabeza: izquierda hembra (vv.bb); derecha juvenil (nn-cxc).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Macho. Diseño del pecho: arriba izquierda nupcial (nn-xx); arriba derecha no nupcial (06-VIII); izquierda 2º año (bb-xx).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Diseño del pecho: izquierda hembra (vv.bb); derecha juvenil (nn-cxc).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Diseño del dorso: izquierda hembra (vv.bb); derecha juvenil (nn-cxc).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Macho. Diseño del dorso: arriba izquierda nupcial (nn-xx); arriba derecha no nupcial (06-VIII); izquierda 2º año (bb-xx).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Sisión común. Macho. Diseño de la cola: arriba izquierda nupcial (nn-xx); arriba derecha no nupcial (06-VIII); izquierda 2º año (bb-xx).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Sisión común. Diseño de la cola: izquierda hembra (vv.bb); derecha juvenil (06-VII).

**FOTO NO DISPONIBLE**

Sisón común. Adulto. Macho: diseño de primarias (nn-xx).

**FOTO NO DISPONIBLE**


Sisón común. 2º año. Hembra: diseño de primarias (oo-vv).

**FOTO NO DISPONIBLE**

Sisón común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (nn-xx).



Sisón común. Juvenil: diseño de primarias (06-VII).



Sisón común. 2º año. Macho: diseño de primarias (06-VIII).

**FOTO NO DISPONIBLE**

Sisón común. Adulto. Macho: diseño de secundarias y coberteras (nn-xx).



Sisión común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (nn-xx).



Sisión común. 2º año. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (cc-vv).



Sisión común. 2º año. Macho: diseño de secundarias y coberteras (06-VIII).



Sisión común. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras (06-VII).

**04420** **Sisón común** (*Tetrax tetrax*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Sisón común. Macho. Diseño de escapulares: arriba izquierda nupcial (nn-xx); arriba derecha no nupcial (mm-vv); izquierda 2º año (06-VIII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Sisón común. Diseño de escapulares: izquierda hembra (vv.bb); derecha juvenil (06-VII).



Sisón común. Juvenil: diseño del ala (06-VII).



Sisón común. 2º año. Macho: diseño del ala (06-VIII).

