

05120 Correlimos común (*Calidris alpina*)



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse (27-XI)

IDENTIFICACIÓN

17-18 cm. En plumaje **nupcial** con dorso castaño y vientre negro; en **invierno** con dorso gris y vientre blanco; cabeza con ceja clara; ala con una banda blanca; pico largo y ligeramente curvado; patas oscuras.



Correlimos común. Otoño. Adulto.

ESPECIES SIMILARES

En plumaje **nupcial** inconfundible debido a la mancha oscura de las partes inferiores. En plumaje **no nupcial**, las patas oscuras lo diferencian de las especies de correlimos habituales en Aragón, excepto del **correlimos menudo**, que tiene el pico más corto y es de menor tamaño (13-14 cm), y del **correlimos zarapitín**, que tiene el pico más largo y obispillo blanco.



Correlimos menudo



Correlimos zarapitín.
Primavera

SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con nuca gris claro finamente listada de oscuro contrastando con el púleo y manto (**CUIDADO**: algunos ejemplares carecen de collar). **Hembra** con nuca marrón y listada contrastando poco con el púleo y manto (**Nota**: no se muestran imágenes de sexado). En plumaje **de eclipse** ambos sexos con diseño similar. **Nota**: la **hembra** es de mayor tamaño que el **macho**, pero es necesario conocer el origen geográfico para sexar sin errores. En plumaje **nupcial**, **macho** con nuca gris claro finamente listada de oscuro contrastando con el púleo y manto (**CUIDADO**: algunos ejemplares carecen de collar). **Hembra** con nuca marrón y listada contrastando poco con el púleo y manto. En plumaje **de eclipse** ambos sexos con diseño similar. **Nota**: la **hembra** es de mayor tamaño que el **macho**, pero es necesario conocer el origen geográfico para sexar sin errores.



Correlimos común. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la nuca: izquierda macho; derecha hembra.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las zonas de reproducción (la cantidad de plumas cambiadas depende del origen geográfico), suspendida durante la migración y terminada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, algunas coberteras del ala y ocasionalmente algunas terciarias y plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial que incluye plumas corporales y a veces medianas coberteras del ala.

05120 Correlimos común (*Calidris alpina*)

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que se reconocen solo 3 tipos de edad:

1º año otoño similar al **adulto** pero con partes inferiores blancas con flancos con moteado marrón amplio; puede haber plumas **juveniles** retenidas (con bordes castaño/ante) en coberteras del ala, supracoberteras de la cola, partes superiores y terciarias; punta de coberteras primarias internas con borde blanco delgado; plumas no mudadas de la cola puntiagudas.

2º año primavera con las plumas **juveniles** retenidas extremadamente desgastadas; medianas coberteras del ala retenidas con restos de bordes ante; primarias **juveniles** retenidas muy desgastadas.

Adulto en **otoño**, después de la muda **postnupcial** con partes inferiores blancas con flancos con escaso moteado marrón; coberteras del ala grises con bordes blancos; punta de coberteras primarias internas con borde blanco ancho; plumas mudadas de la cola con punta redondeada; dorso gris (**CAUIDADO**: algunas plumas nupciales pueden quedar retenidas en el dorso). En **plumaje nupcial (primavera)** con partes superiores marrón negro con bordes castaño y gris claro; coberteras del ala grises, las externas con punta clara y las internas con borde blanco; vientre negro; primarias nuevas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado ()



Correlimos común. Otoño. 1º año (02-IX)



Correlimos común. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto poco mudado (); centro adulto en eclipse (27-XI); abajo 1º año (02-IX).



Correlimos común. Otoño. Diseño de la nuca: arriba izquierda adulto poco mudado (); arriba derecha adulto en eclipse (27-XI); izquierda 1º año (02-IX).

05120 Correlimos común (*Calidris alpina*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto poco mudado (); centro adulto en eclipse (27-XI); abajo 1º año (02-IX).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto poco mudado (); arriba derecha adulto en eclipse (27-XI); izquierda 1º año (02-IX).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Diseño del flanco: arriba adulto poco mudado (); centro adulto en eclipse (27-XI); abajo 1º año (02-IX).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto poco mudado (); arriba derecha adulto en eclipse (27-XI); izquierda 1º año (02-IX).

05120 Correlimos común (*Calidris alpina*)



Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de las coberteras del ala (28-VIII). (Foto: Pere Josa)



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de las coberteras del ala (27-XI).



Correlimos común. Otoño. 1º año: diseño de las coberteras del ala (02-IX).



Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de coberteras primarias (28-VIII). (Foto: Pere Josa)



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de coberteras primarias (27-XI).



Correlimos común. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (02-IX).

05120 Correlimos común (*Calidris alpina*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de primarias (27-XI).



Correlimos común. Otoño. 1º año: diseño de primarias (02-IX).



Correlimos común. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto poco mudado (); arriba derecha adulto en eclipse (27-XI); izquierda 1º año (02-IX).




Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de secundarias (28-VIII). (Foto: Pere Josa)



Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de primarias (28-VIII). (Foto: Pere Josa)



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse: diseño de secundarias (27-XI).



Correlimos común. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (02-IX).



Correlimos común. Otoño. Adulto poco mudado: diseño del ala (28-VIII). (Foto: Pere Josa)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos común. Otoño. Adulto en eclipse: diseño del ala (27-XI)



Correlimos común. Otoño. 1º año: diseño del ala (02-IX)