



Archibebe claro. Primavera. Adulto (04-V).

IDENTIFICACIÓN

30-31 cm. En **invierno** con partes superior del dorso gris y parte inferior blanca; pecho moteado; vientre blanco; cola blanca y barrada; alas pardas con pequeñas puntas claras en las coberteras; pico largo y algo curvado; patas verdosas.



Archibebe claro. Diseño de pico y patas.



ESPECIES SIMILARES

Especie inconfundible por su pico ligeramente curvado hacia arriba y patas verdosas.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que solo pueden reconocerse 3 tipos de edad:

1º año otoño conservando gran parte del plumaje **juvenil**, con las plumas marrón oscuro de las partes superiores con anchos bordes ante; coberteras del ala con nítido borde claro; coberteras medianas con ancho borde ante interrumpido en la parte central por una mancha marrón; plumas centrales de la cola nuevas con fino barrado marrón.

2º año primavera similar al **adulto**, pero identificable si hay coberteras del ala **juveniles** retenidas que estarán muy desgastadas; primarias sin mudar muy desgastadas; plumas externas de la cola no mudadas contrastando fuertemente con las nuevas internas cambiadas..

Adulto en **otoño** con partes superiores grises sin bordes ante; coberteras del ala sin o con borde claro poco marcado; coberteras medianas grises sin borde claro; plumas centrales de la cola desgastadas con barrado marrón oscuro ancho e irregular. En **primavera** con coberteras del ala y terciarias sin fuerte contraste entre las plumas retenidas y cambiadas; primarias ligeramente desgastadas; plumas de la cola con desgaste muy similar.



Archibebe claro. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las plumas del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año.



Archibebe claro. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha 1º año.

05480 Archibebe claro (*Tringa nebularia*)

MUDA

Mudas **postnupcial** completa, comenzada en las áreas de reproducción, suspendida durante la migración y terminada en las zonas de invernada (**CUIDADO:** algunos ejemplares solo comienzan su muda cuando llegan a las áreas de invernada). Muda **postjuvenil** parcial, que abarca plumas corporales, la mayor parte de las escapulares, algunas plumas de la cola, terciarias internas y algunas coberteras del ala; habitualmente comenzada en las zonas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca plumas del cuerpo, algunas coberteras del ala y algunas terciarias.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Archibebe claro. Primavera. 2º año ().




Archibebe claro. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (04-V); abajo 2º año ().




Archibebe claro. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (04-V); abajo 2º año ().



Archibebe claro. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (04-V); derecha 2º año ().



Archibebe claro. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (04-V); derecha 2º año ().





**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe claro. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (04-V); derecha 2º año ().



Archibebe claro. Primavera. Adulto: diseño de las coberteras del ala (04-V).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe claro. Primavera. 2º año: diseño de las coberteras del ala ().



Archibebe claro. Primavera. Adulto: diseño de primarias (04-V).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe claro. Primavera. 2º año: diseño de primarias ().



Archibebe claro. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (04-V).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe claro. Primavera. 2º año: diseño de secundarias ().



Archibebe claro. Primavera. Adulto: diseño del ala (04-V).

05480 Archibebe claro (*Tringa nebularia*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe claro. Primavera. 2º año: diseño del ala ().



Archibebe claro. Otoño. Adulto (21-VII).



Archibebe claro. Otoño. 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (21-VII); abajo 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (21-VII); abajo 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (21-VII); derecha 1º año (24-VIII).

05480 Archibebe claro (*Tringa nebularia*)



Archibebe claro. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (21-VII); abajo 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto poco mudado (15-VIII); arriba derecha adulto con muda extensa (21-VII); izquierda 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto poco mudado (21-VII); arriba derecha adulto con muda iniciada (15-VIII); izquierda 1º año (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de las coberteras del ala (15-VIII).

05480 Archibebe claro (*Tringa nebularia*)



Archibebe claro. Otoño. Adulto con muda extensa: diseño de las coberteras del ala (15-VII).



Archibebe claro. Otoño. 1º año: diseño de las coberteras del ala (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de primarias (15-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto con muda extensa: diseño de primarias (15-VII).



Archibebe claro. Otoño. 1º año: diseño de primarias (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto poco mudado: diseño de secundarias (15-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto con muda extensa: diseño de secundarias (15-VII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto con muda extensa: diseño del ala (15-VII).



Archibebe claro. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. 1º año: diseño del ala (24-VIII).



Archibebe claro. Otoño. Adulto poco mudado: diseño del ala (15-VIII).