



Andarrios grande. Primavera. Adulto (21-III).

IDENTIFICACIÓN

24-26 cm. Partes superiores pardo verdosas, con moteado blancuzco; ceja fina; partes inferiores blancas, con pecho rayado; alas oscuras sin banda blanca; infracoberteras del ala oscuras; obispillo blanco; cola blanca, finamente barrada; pico oscuro con base verdosa; patas verdosas.



Andarrios grande. Diseño del obispillo, cola, ala e infracoberteras alares.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda a un **andarrios chico**, que es de menor tamaño, sin obispillo blanco y con línea blanca en el ala. El **andarrios bastardo** es muy parecido pero tiene una ceja nítida y las infracoberteras del ala son claras.



Andarrios chico.



Andarrios bastardo.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 3 tipos de edad:

1º año con plumas del dorso y coberteras del ala marrón claro con profuso moteado ante; terciarias y escapulares con amplias manchas blancas subterminales; plumas de vuelo nuevas sin límites de muda.


2º año primavera reconocibles por mantener las plumas de vuelo **juveniles** que estarán de moderadamente a muy desgastadas; coberteras del ala con mezcla de plumas **juveniles** muy desgastadas contrastando con las nuevas moteadas; generalmente con una o todas las terciarias cambiadas con diseño de **adulto**; a veces con alguna primaria externa mudada.

Adulto en **otoño** con las plumas del dorso y coberteras del ala marrón oliva, con difuso moteado blanco o ante; terciarias y escapulares con pequeñas manchas blancas subterminales; plumas de vuelo desgastadas y generalmente con límites de muda o en muda activa. En **primavera** con plumas de vuelo ligeramente desgastadas; coberteras del ala con desgaste y moteado similar.

05530 Andarríos grande (*Tringa ochropus*)



Andarríos grande. Otoño. Determinación de la edad. Color del moteado de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.



Andarríos grande. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del moteado de escapulares y terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las áreas de cría y terminada en sus zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial cambiando plumas corporales, terciarias, plumas centrales de la cola y algunas coberteras internas, dejando sin mudar las plumas de vuelo; comenzada habitualmente en a las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales, todas o parte de escapulares y terciarias y algunas coberteras internas del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Andarríos grande. Primavera. 2º año (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (21-III); abajo 2º año (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (21-III); abajo 2º año (06-IV).





Andarríos grande. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (21-III); derecha 2º año (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (21-III); derecha 2º año (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Diseño de terciaras y escapulares: izquierda adulto (21-III); derecha 2º año (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Adulto: diseño de coberteras del ala (21-III).



Andarríos grande. Primavera. 2º año: diseño de coberteras del ala (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Adulto: diseño de primarias (21-III).



Andarríos grande. Otoño. 2º año: diseño de primarias (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (21-III).



Andarríos grande. Primavera. 2º año: diseño del ala (06-IV).



Andarríos grande. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (06-IV).



Andarríos grande. Otoño. Adulto (21-VIII).



Andarríos grande. Primavera. Adulto: diseño del ala (21-III).



Andarríos grande. Otoño. Juvenil (27-VII).

05530 Andarríos grande (*Tringa ochropus*)



Andarríos grande. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (11-VII); abajo juvenil (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (11-VII); derecha juvenil (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (11-VII); abajo juvenil (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (11-VII); derecha juvenil (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Diseño de terciaras y escapulares: izquierda adulto (11-VII); derecha juvenil (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto no mudado: diseño de coberteras del ala (11-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de coberteras del ala (21-VIII).



Andarríos grande. Otoño. Juvenil: diseño de coberteras del ala (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto no mudado: diseño de primarias (11-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de primarias (21-VIII).



Andarríos grande. Otoño. Juvenil: diseño de primarias (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto no mudado: diseño de secundarias (11-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de secundarias (21-VIII).



Andarríos grande. Otoño. Juvenil: diseño de secundarias (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Juvenil: diseño del ala (27-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto no mudado: diseño del ala (11-VII).



Andarríos grande. Otoño. Adulto en muda activa: diseño del ala (21-VIII).

