

05540 Andarriós bastardo (*Tringa glareola*)



Andarriós bastardo. Primavera. Adulto (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).

IDENTIFICACIÓN

19-20 cm. Partes superiores pardo verdosas, con moteado blancuzco; ceja conspicua; partes inferiores blancas, con pecho rayado; alas oscuras sin banda blanca; infracoberteras del ala claras; obispillo blanco; cola blanca, finamente barrada; pico oscuro; patas verdosas.



Andarriós bastardo. Diseño del obispillo, cola, ala e infracoberteras alares.



ESPECIES SIMILARES

Recuerda a un **andarriós chico**, que es de menor tamaño, sin obispillo blanco y con línea blanca en el ala. El **andarriós grande** es muy parecido pero carece de ceja clara y tiene las infracoberteras del ala oscuras.



Andarriós chico.



Andarriós grande.



SEXO

Plumaje de ambos sexos similar

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que solo pueden reconocerse 3 tipos de edad:


1º año otoño con plumaje muy nuevo; terciarias y coberteras del ala marrón oscuro, intensamente moteadas de ante-marrón con centro oscuro en la punta; escapulares moteadas con punta oscura; plumas de vuelo con una sola generación; primarias externas con puntas agudas.

2º año primavera con las plumas externas de la cola **juveniles** retenidas claramente desgastadas; si están mudadas, con contraste entre las primarias externas nuevas y las internas **juveniles** desgastadas; si todas las plumas de vuelo **juveniles** están sin mudar entonces con una sola generación y con las primarias externas con puntas agudas.

Adulto con coberteras alares marrones, barradas y moteadas de marrón claro y blanco, con punta clara no interrumpida; terciarias más barradas que moteadas, con punta clara; escapulares moteadas con punta clara; primarias externas con puntas redondeadas. En **otoño** con plumas de vuelo desgastadas o en muda activa. En **primavera** con un ligero contraste entre las primarias externas nuevas y las internas poco desgastadas o todas las plumas de vuelo solo ligeramente desgastadas; plumas externas de la cola nuevas.



Andarriós bastardo. Primavera. Determinación de la edad. Adulto: desgaste de las plumas externas de la cola. Foto: Ottenby Bird Observatory.




Andarriós bastardo. Primavera. Determinación de la edad. 2º año: desgaste de las plumas externas de la cola. Foto: Ottenby Bird Observatory.

05540 Andarríos bastardo (*Tringa glareola*)



Andarríos bastardo. Verano. Determinación de la edad. Adulto: diseño de escapulares, terciarias y coberteras del ala.



Andarríos bastardo. Verano. Determinación de la edad. 1º año: diseño de escapulares, terciarias y coberteras del ala.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando generalmente durante la migración y terminada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial cambiando plumas corporales y escapulares durante la migración y continuada en las zonas de invernada con terciarias, plumas centrales de la cola y algunas coberteras del ala (**CUIDADO**: algunos ejemplares, tanto **adultos** como de **1º año**, migran directamente a sus zonas de invernada con plumaje sin mudar). Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial que incluye plumas corporales, parte o todas las escapulares, algunas coberteras del ala y a menudo terciarias y plumas centrales de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory); abajo 2º año (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory); abajo 2º año (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).

05540 Andarríos bastardo (*Tringa glareola*)



Andarríos bastardo. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 2º año (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Adulto: diseño de la cola (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año: diseño de la cola (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 2º año (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Adulto: diseño de coberteras del ala (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año: diseño de coberteras del ala (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Adulto: diseño de primarias (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año: diseño de primarias (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. Adulto: diseño del ala (03-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Andarríos bastardo. Primavera. 2º año: diseño del ala (07-V) (Fotos: Ottenby Bird Observatory).

05540 Andarríos bastardo (*Tringa glareola*)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto (29-VII).



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (29-VII); abajo juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (29-VII); abajo juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (29-VII); derecha juvenil (26-VIII).

05540 Andarríos bastardo (*Tringa glareola*)




Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto no mudado (29-VII); arriba derecha adulto en muda activa (18-VIII); izquierda juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de terciarias y escapulares: arriba izquierda adulto no mudado (29-VII); arriba derecha adulto en muda activa (18-VIII); izquierda juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de coberteras del ala (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de coberteras del ala (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de coberteras del ala (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de primarias (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de primarias (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de primarias (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de secundarias (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de secundarias (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de secundarias (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño del ala (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño del ala (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño del ala (26-VIII)