



Andarríos chico. Primavera. Adulto (01-V).

IDENTIFICACIÓN

19-22 cm. Partes superiores pardo oliva, incluido el obispillo y cola; partes inferiores blancas, con pecho ligeramente rayado de oscuro; alas con banda blanca; pico oscuro y patas verdosas.



Andarríos chico. Diseño del obispillo, cola y ala.

ESPECIES SIMILARES

El andarríos grande es parecido, pero de mayor tamaño, con obispillo blanco y sin línea blanca en el ala.



Andarríos grande.



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumas del dorso marrones con amplia punta ante y bandas subterminales oscuras; escapulares y terciarias con una línea subterminal estrecha y redondeada bordeada de ante en la punta, sin barrado; coberteras del ala con doble barrado marrón y punta ante; plumas centrales de la cola sin barrado o moteado en los lados; plumas de vuelo nuevas y siempre de una generación; algunos ejemplares tienen las patas con tinte rosado.

2º año reconocibles sólo los ejemplares que han retenido coberteras medianas o alguna pluma de vuelo o de la cola juveniles, que estarán muy desgastadas contrastando con las plumas cambiadas.

Adulto con las plumas del dorso con moteado oscuro y barrado irregular; escapulares y terciarias barradas; coberteras del ala con una única barra subterminal oscura y punta ante claro; plumas centrales de la cola con una banda subterminal oscura y barras cortas o moteado en los lados; patas de color gris verdoso. En otoño plumas de vuelo con dos generaciones o, si sólo tiene una, con plumas desgastadas.





Andarríos chico. Verano. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.







Andarríos chico. Verano. Determinación de la edad. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.






Andarríos chico. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las áreas de reproducción con algunas plumas corporales y terminada en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es completa o casi completa ya que algunos ejemplares pueden retener medianas coberteras y plumas del ala y la cola; generalmente comenzada en las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye la mayor parte de las plumas corporales, coberteras del ala, escapulares y la mayor parte de terciarias y plumas de la cola.

FENOLOGÍA





Andarríos chico. Primavera. 2º año (02-V).





Andarríos chico. Primavera.
Diseño de la
cabeza y color
del pico: arriba
adulto (01-V);
abajo 2º año
(02-V).





Andarríos chico. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (01-V); abajo 2º año (02-V).







Andarríos chico. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (01-V); derecha 2º año (02-V).





Andarríos chico. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (01-V); derecha 2º año (02-V).





Andarríos chico. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (01-V); derecha 2º año (02-V).



Andarríos chico. Primavera. Adulto: diseño de coberteras del ala (01-V).



Andarríos chico. Primavera. 2º año: diseño de coberteras del ala (1 plumas juveniles; 2 plumas postjuveniles) (02-V).





Andarríos chico. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (01-V).



Andarríos chico. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (02-V).



Andarríos chico. Primavera. Adulto: diseño de primarias (01-V).



Andarríos chico. Primavera. 2º año: diseño de primarias (02-V).





Andarríos chico. Primavera. Adulto: diseño del ala (01-V).





Andarríos chico. Primavera. 2° año: diseño del ala (02-V).

4





Andarríos chico. Verano. Adulto con plumaje desgastado (31-VII).



Andarríos chico. Verano. Juvenil (05-VIII).



Andarríos chico. Verano. Adulto con plumaje poco desgastado (27-VII).





Andarríos



Andarríos chico. Verano. 2º año (12-VIII).







Andarríos chico. Verano. Diseño del pecho: arriba adulto (27-VII); centro 2º año (12-VIII); abajo juvenil (05-VIII).









Andarríos chico. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda con plumaje poco desgastado (27-VII); derecha con plumaje desgastado (31-VII).





Andarríos chico. Verano. Diseño del dorso: izquierda 2º año (12-VIII); derecha juvenil (05-VIII).



Andarríos chico. Verano. Color de las patas: arriba adulto (27-VII); abajo 2º año (12-VIII).







Andarríos chico. Verano. Juvenil. Color de las patas: arriba con patas verdosas (05-VIII); abajo con patas rosadas (01-VIII).

6









Andarríos chico. Verano. Diseño de escapulares y terciarias: arriba izquierda adulto (27-VII); arriba derecha 2º año (12-VIII); izquierda juvenil (05-VIII).







Andarríos chico. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (27-VII); arriba derecha 2º año (12-VIII); izquierda juvenil (05-VIII).



Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño de las coberteras del ala con plumaje desgastado (31-VII).



Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño de las coberteras del ala con plumaje poco desgastado (27-VII).





Andarríos chico. Verano. 2º año: diseño de las coberteras del ala (12-VIII).



Andarríos chico. Verano. Juvenil: diseño de primarias (05-VIII).



Andarríos chico. Verano. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (05-VIII).



Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño de secundarias con plumaje desgastado (31-VII).



Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño de primarias (27-VII).



Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño de secundarias con plumaje poco desgastado (27-VII).



Andarríos chico. Verano. 2º año: diseño de primarias (12-VIII).





Andarríos chico. Verano. 2º año: diseño de secundarias (12-VIII).



Andarríos chico. Verano. Juvenil: diseño de secundarias (05-VIII).





Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño del ala con plumaje desgastado (31-VII).





Andarríos chico. Verano. Adulto: diseño del ala con plumaje poco desgastado (27-VII).





Andarríos chico. Verano. 2º año: diseño del ala (12-VIII).





Andarríos chico. Verano. Juvenil: diseño del ala (05-VIII).