



Críalo. Adulto (28-II).

IDENTIFICACIÓN

39-45 cm. **Adulto** con dorso pardo ampliamente moteado de blanco; partes inferiores amarillo crema; cola larga; penacho conspicuo en la cabeza; alas pardas. **Juveniles** con primarias de color castaño; sin penacho; partes inferiores muy amarillas.



Críalo. Adulto. Diseño de la cabeza.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar. El tamaño puede ser útil en aves extremas: **macho** con ala mayor de 212 mm; cola mayor de 212 mm. **Hembra** con ala menor de 200 mm; cola menor de 198 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con píleo negro; dorso negro moteado de blanco; garganta y pecho amarillo intenso; primarias de color castaño; secundarias con mancha blanca pequeña en la punta.

2º año con primarias con un tinte ocre si ha hecho muda completa (**CAUIDADO:** algunos ejemplares tienen muy poco ocre en las primarias); si tiene muda parcial, entonces con contraste entre las secundarias **juveniles** retenidas, más cortas y con la mancha blanca de la punta más delgada que las cambiadas de tipo **adulto**.

Adulto con píleo gris; dorso gris moteado de blanco; garganta y pecho amarillo claro; primarias de color gris; secundarias con mancha blanca grande en la punta. **CAUIDADO:** si ha dejado sin mudar alguna secundaria, entonces hay dos generaciones de plumas, aunque todas tienen las puntas con igual mancha blanca grande.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de la garganta y pecho: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Críalo. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, comenzando en las áreas de invernada; **ambos tipos de edad** pueden interrumpir su muda teniendo en primavera dos generaciones de plumas de vuelo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Críalo. 2º año con primarias rojizas (08-IV).



Críalo. 2º año con primarias poco rojizas (22-III).



Críalo. Juvenil (02-VI).



Críalo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba adulto (28-II); centro 2º año (08-IV); abajo juvenil (02-VI).





Críalo. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulta (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Juvenil: diseño de coberteras primarias (02-VI).



Críalo. Diseño del obispillo: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Adulto: diseño de coberteras primarias (28-II).



Críalo. 2º año: diseño de coberteras primarias (08-IV).



Críalo. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (08-IV); izquierda juvenil (02-VI).



Críalo. Adulto: diseño de primarias (28-II).



Críalo. Juvenil: diseño de primarias (02-VI).



Críalo. 2º año: diseño de primarias con poco tinte rojizo (22-III).



Críalo. Adulto con muda completa: diseño de secundarias y coberteras del ala (28-II).




Críalo. 2º año: diseño de primarias con tinte rojizo (08-IV).



Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño de secundarias y coberteras del ala (28-II).



Críalo. 2º año con muda completa: diseño de secundarias y coberteras del ala (08-IV).



Críalo. 2º año con muda parcial: diseño de secundarias y coberteras (1 plumas de juvenil, 2 plumas de adulto) (22-III).



Críalo. Juvenil. Diseño de secundarias y coberteras del ala (02-VI).



Críalo. Adulto con muda completa: diseño del ala (28-II).



Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño del ala (28-II).



Críalo. 2º año con primarias rojizas y muda completa: diseño del ala (08-IV).



Críalo. 2º año con primarias poco rojizas y muda parcial: diseño del ala (22-III).



Críalo. Juvenil: diseño del ala (02-VI).