



Cuco. Adulto. Macho (02-VI).

IDENTIFICACIÓN

32-34 cm. **Adulto** con dorso y cabeza gris; partes inferiores barradas; cola larga, con manchas blancas en la punta; algunas **hembras** tienen las partes superiores de color ocre fuertemente ondeado de oscuro, con obispillo y cabeza rojizos. **Juveniles** de color castaño y barrados.

ESPECIES SIMILARES

Por la cola larga y el tamaño puede recordar a un **gavilán** o un **cernícalo**, pero no tiene pico ganchudo.



Gavilán



Cernícalo vulgar



<http://blascozumeta.com>

SEXO


Macho con la nuca, mentón y garganta de color gris extendiéndose hacia el pecho; con una línea nítida de separación entre el gris del pecho y el barrado del vientre; medianas y grandes coberteras de color gris, siempre sin moteado ante. **Hembra** con dos diseños de color; en **diseño rojizo** parecido al **juvenil** y es inconfundible; en **diseño gris** muy parecido al **macho**, pero habitualmente con garganta y pecho teñidos de ocre bajo el barrado del pecho y lados del cuello, sin una línea nítida de separación; a veces medianas y grandes coberteras con moteado ante (**CUIDADO**: algunas **hembras** con **diseño gris** son indistinguibles de los **machos**). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Cuco. Determinación del sexo. Diseño del pecho: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra con diseño gris; izquierda hembra con diseño rojizo.



Cuco. Determinación del sexo en aves con diseño gris. Diseño de coberteras del ala: arriba macho/hembra sin moteado; abajo hembra con moteado ante (foto: Marlis Forcher).



<http://www.aranzadi.eus>

265 Cuco común (*Cuculus canorus*)

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; plumaje con diseño muy variable en el dorso yendo desde barrado ocre intenso hasta el gris uniforme con bordes blancos; coberteras del ala y plumas de vuelo con bordes blancos; secundarias y grandes coberteras con barrado o moteado castaño; mancha blanca en la nuca; iris de color gris.

2º año indistinguible si la muda ha sido completa; si coberteras alares o secundarias han sido retenidas entonces con límite de muda entre las plumas **juveniles** barradas y desgastadas y las plumas con diseño de **adulto**, sin barrado, más largas y nuevas (**CUIDADO**: en **juveniles** con barrado poco marcado estas plumas pueden ser difíciles de detectar).

Adulto con coberteras del ala y plumas de vuelo sin bordes blancos; secundarias sin barrado castaño; sin mancha blanca en la nuca; ojo de color amarillo.

CUIDADO: algunos adultos interrumpen la muda y tienen en primavera secundarias de dos generaciones diferenciables por el distinto desgaste, pero las plumas viejas carecen del barrado **juvenil**.



Cuco. Determinación de la edad. Diseño del ojo: arriba adulto; abajo juvenil.



Cuco. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: adulto



Cuco. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: 2º año (foto: Pere Josa)



Cuco. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, comenzando en las zonas de invernada; **ambos tipos de edad** pueden interrumpir su muda teniendo entonces en primavera dos generaciones de plumas de vuelo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris (28-V)



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris y rojizo (18-V)




Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo (05-V).

265 Cuco común (*Cuculus canorus*)



Cuco. 2º año. Macho (28-V)



Cuco. 2º año. Hembra ().



Cuco. Juvenil (21-VIII).



Cuco. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-VI); centro hembra con diseño gris (28-V); abajo hembra con diseño gris y rojizo (18-V).



Cuco. Adulto. Diseño de la cabeza: hembra con diseño rojizo (05-V).



Cuco. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (28-V); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21-VIII).



Cuco. Adulto. Diseño de la nuca: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño gris (28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris y rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño rojizo (05-V).

265 **Cuco común** (*Cuculus canorus*)



FOTO NO DISPONIBLE



FOTO NO DISPONIBLE



Cuco. Diseño de la nuca: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).



Cuco. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).



Cuco. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño gris (28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris y rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño rojizo (05-V).

Cuco. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño gris (28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris y rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño rojizo (05-V).

265 **Cuco común** (*Cuculus canorus*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Cuco. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).



Cuco. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).



Cuco. Adulto. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño gris (28-V); izquierda hembra con diseño rojizo (05-V).



Cuco. Adulto. Macho: diseño de primarias (26-IV).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de primarias (28-V).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño de primarias (05-V).



Cuco. 2º año. Macho: diseño de primarias (28-V).



Cuco. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().



Cuco. Juvenil: diseño de primarias (21-VIII).



Cuco. Adulto. Macho con muda completa: diseño de coberteras del ala y secundarias (26-IV).



Cuco. Adulto. Macho con muda interrumpida: diseño de coberteras del ala y secundarias (12-IV).



Cuco. Adulto. Hembra con muda interrumpida: diseño de coberteras del ala y secundarias (18-V).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de coberteras del ala sin moteado y secundarias (25-V).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño de coberteras del ala y secundarias (05-V).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de coberteras del ala con moteado y secundarias (14-VI) (Foto: Guillermo López Zamora).



Cuco. 2º año. Macho: diseño de coberteras del ala y secundarias (28-V).




Cuco. 2º año. Hembra: diseño de coberteras del ala y secundarias ().



Cuco. Juvenil: diseño de coberteras del ala y secundarias (21-VIII).



Cuco. Adulto. Macho con muda completa: diseño del ala (26-IV).



Cuco. Adulto. Macho con muda interrumpida: diseño del ala (12-IV).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño del ala sin moteado en coberteras (28-VI).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño del ala con moteado en coberteras (14-VI) (Foto: Guillermo López Zamora).



Cuco. Adulto. Hembra con muda interrumpida: diseño del ala (18-V).



Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño del ala (05-V).



Cuco. 2º año. Macho: diseño del ala (28-V).



Cuco. 2º año. Hembra: diseño del ala ().



Cuco. Juvenil: diseño del ala (21-VIII).