



Pito real. Adulto. Macho (18-IV).

IDENTIFICACIÓN

30-32 cm. Dorso de color verde, con reflejos amarillos; partes inferiores gris verdoso; pìleo rojo; **macho** con bigotera roja, **hembra** con bigotera oscura. **Juveniles** de tonos similares a los **adultos** pero con manchas blancas en el dorso y oscuras en las partes inferiores.



Pito real. Diseño del dorso y pìleo.

ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

SEXO

Los **adultos** pueden sexarse por la coloración de la bigotera: **macho** con bigotera roja bordeada de negro; **hembra** con bigotera oscura, sin rojo. En **juveniles** sólo los **machos** con bigotera roja se pueden sexar con seguridad; algunos **machos** muy jóvenes pueden tener la bigotera oscura, por lo que este carácter en **juveniles** es fiable sólo para sexado cuando la muda de las plumas corporales está avanzada.



Pito real. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la bigotera: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con dorso moteado de blanco; partes inferiores moteadas de oscuro; terciarias con punta clara y barrado claro; coberteras primarias estrechas.

1º año otoño/2º año primavera de aspecto similar al **adulto**, pero con contraste entre las plumas del ala mudadas y **juveniles** retenidas; si alguna terciaria ha sido mudada es verdosa y nueva contrastando con las **juveniles** no cambiadas más claras, desgastadas y con barrado claro; si no ha mudado ninguna terciaria entonces todas las plumas desgastadas y con barrado claro; las coberteras primarias permanecen juveniles (a veces alguna cambiada y entonces el límite de muda es fácil de ver) por lo que están más desgastadas que las plumas vecinas.

Adulto con todas las plumas de la misma generación; dorso y partes inferiores sin moteado; terciarias verdosas sin punta clara; coberteras primarias anchas y redondeadas, con desgaste similar al del resto de las coberteras.




Pito real. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.



Pito real. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Pito real. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Pito real. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comienza en el mes de junio y suele estar terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, todas o parte de las grandes coberteras, a veces una o dos terciarias, primarias y cola, por lo que coberteras primarias (a veces algunas son cambiadas) y secundarias quedan sin mudar; generalmente terminada en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Pito real. Adulto. Hembra (30-I).



Pito real. 2º año. Macho (18-IV).

08560 Pito real (*Picus viridis*)



Pito real. 2º año. Hembra (17-V).



Pito real. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-IV); abajo hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Macho (08-VIII).



Pito real. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (08-VIII); abajo macho / hembra (08-VIII).



Pito real. Juvenil. Macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).



Pito real. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-IV); abajo hembra (30-I).



08560 Pito real (*Picus viridis*)



Pito real. 2º año. Diseño del píleo: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).



Pito real. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).



Pito real. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).



Pito real. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).

08560 Pito real (*Picus viridis*)



Pito real. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (18-IV).



Pito real. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (30-I).



Pito real. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (18-IV).



Pito real. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (17-V).

08560 Pito real (*Picus viridis*)



Pito real. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (08-VIII).



Pito real. Juvenil. Macho/hembra: diseño de coberteras primarias (08-VIII).



Pito real. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (30-I).



Pito real. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (17-V).



Pito real. Juvenil. Diseño de terciarias: izquierda macho (08-VIII); derecha macho/hembra (08-VIII).



Pito real. Adulto. Macho: diseño de primarias (18-IV).



Pito real. 2º año. Hembra: diseño de primarias (17-V).



Pito real. Adulto. Hembra: diseño de primarias (30-I).



Pito real. Juvenil. Macho: diseño de primarias (08-VIII).




Pito real. 2º año. Macho: diseño de primarias (18-IV).



Pito real. Juvenil. Macho/hembra: diseño de primarias (08-VIII).



Pito real. Adulto. Macho: diseño de secundarias (18-IV).



Pito real. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (30-I).



Pito real. 2º año. Macho: diseño de secundarias (18-IV).



Pito real. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (17-V).



Pito real. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (08-VIII).




Pito real. Juvenil. Macho/hembra: diseño de secundarias (08-VIII).



Pico picapinos. Adulto. Macho: diseño del ala (18-IV).



Pito real. Juvenil. Macho: diseño del ala (08-VIII).



Pito real. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-I).



Pito real. Juvenil. Macho/hembra: diseño del ala (08-VIII).



Pito real. 2º año. Macho: diseño del ala (18-IV).



Pito real. 2º año. Hembra: diseño del ala (17-V).