

298 Terrera marismeña

Pon tu logo aquí



Terrera marismeña. Adulto (04-V).

TERRERA MARISMEÑA (*Alaudala rufescens*)

IDENTIFICACIÓN

13-15 cm. Partes superiores pardo listadas de oscuro; partes inferiores blancuzcas, con pecho listado con rayas finas; cabeza sin cresta; con el ala plegada las terciarias no cubren toda el ala; pico corto y con mandíbula inferior abombada; boca clara en periodo nupcial. Los **juveniles** tienen manchas oscuras en el pecho y ribetes blancuzcos en las plumas del ala y dorso.



Terrera marismeña. Adulto.



Terrera marismeña. Primavera. Adulto: color de la boca.



Terrera marismeña. Juvenil.



ESPECIES SIMILARES

De entre las especies de aláudidos pequeñas, la **totovía** se separa por su ceja blanca que se junta en la nuca y la mancha negra de las coberteras primarias. La **terrera común** es muy parecida, pero tiene el pecho sin moteado y con dos manchas negras en los lados, las terciarias cubren todo el ala y la boca en negra en periodo nupcial; los **juveniles** de ambas especies son muy difíciles de separar ya que ambos tienen las terciarias cortas y el mismo diseño de pecho, debiendo recurrirse a la forma del pico y al tono general más claro de la **terrera común**.



Totovía

298 Terrera marismeña

Pon tu logo aquí



Terrera común. Adulto.



Terrera común. Juvenil.



Terrera marismeña. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto; abajo juvenil.



Terrera marismeña. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con borde blanco claro en coberteras del ala; plumaje nuevo.

Adulto con borde ante en coberteras del ala (habitualmente perdido por erosión); plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria restringida a las zonas de vegetación esteparia del Valle del Ebro.

298 Terrera marismeña

Pon tu logo aquí



Terrera marismeña. Juvenil (28-VI)



Terrera marismeña. Diseño del dorso: izquierda adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI)



Terrera marismeña. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto (04-V); abajo juvenil (28-VI)



Terrera marismeña. Fórmula alar: las terciarias no alcanzan nunca la punta de las primarias: arriba adulto (04-V); abajo juvenil (06-VII).



Terrera marismeña. Diseño del pecho: izquierda adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI)



Terrera marismeña. Color de las patas: izquierda adulto (04-V); derecha juvenil (06-VII).

298 **Terrera marismeña**

Pon tu logo aquí



Terrera marismeña. Diseño de la cola: izquierda adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI).



Terrera marismeña. Adulto: diseño del ala (04-V).



Terrera marismeña. Juvenil: diseño del ala (28-VI).