

299 Cogujada común




Pon tu logo aquí



Cogujada común. Adulto (19-V).

COGUJADA COMÚN (*Galerida cristata*)**IDENTIFICACIÓN**

16-19 cm. Plumaje pardo; plumas externas de la cola ocre; cabeza con cresta y ceja; punta de la mandíbula inferior recta; pecho difusamente estriado; supracoberteras caudales grises, sin contraste con el obispillo; infracoberteras alares de color herrumbre; la 10ª primaria es siempre menor que las coberteras primarias; primarias 7ª, 8ª y 9ª más largas que las demás. Los **juveni-**les tienen ribetes blancuzcos en las plumas.



Cogujada común. Juvenil: diseño del ala, pecho, dorso, infracoberteras del ala, fórmula alar y cabeza y pico.

Cogujada común. Adulto: diseño de cabeza y pico, coberteras de la cola, pecho, fórmula alar e infracoberteras alares.



299 Cogujada común


Pon tu logo aquí

ESPECIES SIMILARES

De entre las especies con “moño”, la **alondra común** se separa por las plumas externas de la cola blancas. La **cogujada montesina** es muy parecida, pero tiene las supracoberteras caudales ocre, infracoberteras alares grises, pecho con moteado más nítido, la 10ª primaria puede ser, aunque no siempre, mayor que las coberteras primarias y el pico menor y con la mandíbula inferior convexa en la punta. Los **juveniles** de ambas especies son difíciles de separar, debiendo recurrirse a la forma del pico, fórmula alar y al tono más oscuro del plumaje de la **cogujada montesina**.



Cogujada montesina. Adulto.



Cogujada montesina. Juvenil.

299 Cogujada común

Pon tu logo aquí



Alondra común.

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar las aves extremas: **macho** con ala mayor de 106 mm; **hembra** con ala menor de 104 mm.



EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con nítidos bordes claros en coberturas del ala; cresta corta; plumaje nuevo.

Adulto sin borde claro nítido en coberturas del ala; cresta larga; plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Cogujada común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Cogujada común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Cogujada común. Determinación de la edad. Diseño de las coberturas del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN


Especie sedentaria. Presente en todo Aragón excepto en las zonas más montañosas de los Pirineos y Sistema Ibérico.

299 Cogujada común

Pon tu logo aquí




Cogujada común. Juvenil. (08-VII).



Cogujada común. Diseño del dorso: izquierda adulto (19-V); derecha juvenil (08-VII)



Cogujada común. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto (19-V); abajo juvenil (08-VII)



Cogujada común. Diseño de la cola: izquierda adulto (19-V); derecha juvenil (23-VII)




Cogujada común. Diseño del pecho: arriba adulto (19-V); abajo juvenil (08-VII)




Cogujada común. Diseño de las patas: izquierda adulto (11-VI); derecha juvenil (10-VII)

299 Cogujada común

Pon tu logo aquí



Cogujada común.
Fórmula
alar: arriba
adulto (19-
V); abajo
juvenil (23-
VII)



Cogujada común. Adulto: diseño del ala (19-V).



Cogujada común. Juvenil: diseño del ala (10-VII)