

300a Identificación de cogujadas

Pon tu logo aquí

IDENTIFICACIÓN DE ADULTOS Y JUVENILES DE COGUJADA COMÚN Y COGUJADA MONTESINA.

ADULTOS

Los **adultos** pueden separarse por el diseño del moteado del pecho, forma del pico, color de las supracoberteras caudales, color de las infracoberteras alares, longitud de la 10ª primaria y longitud de las primarias 7ª a 9ª.



Diseño del moteado del pecho: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.




Forma del pico: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.




Color de las supracoberteras caudales: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Color de las infracoberteras alares: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Longitud de primarias: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.



JUVENILES

Los **juveniles** son más difíciles de separar, debiendo utilizarse la forma del pico (**CUIDADO:** sólo en ejemplares bien desarrollados) y el tono general del plumaje; el diseño del moteado del pecho y el color de las infracoberteras alares no siempre es útil.




Forma del pico: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.



300a Identificación de cogujadas

Pon tu logo aquí



Longitud de primarias:
arriba cogujada común;
abajo cogujada montesina.

Tono del plumaje: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Diseño del moteado del pecho: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Color de las infracoberteras alares: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.

Diseño del ala: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.