

**IDENTIFICACIÓN DE ADULTOS Y JUVENILES DE COGUJADA COMÚN Y COGUJADA MONTESINA.**

**ADULTOS**

Los **adultos** pueden separarse por el diseño del moteado del pecho, forma del pico, color de las supracoberteras caudales, color de las infracoberteras alares, longitud de la 10ª primaria y longitud de las primarias 7ª a 9ª.



Diseño del moteado del pecho: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.




Forma del pico: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.



Color de las supracoberteras caudales: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Color de las infracoberteras alares: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Longitud de primarias: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.



**JUVENILES**

Los **juveniles** son más difíciles de separar, debiendo utilizarse la forma del pico (**CAUTION**: sólo en ejemplares bien desarrollados) y el tono general del plumaje; el diseño del moteado del pecho y el color de las infracoberteras alares no siempre es útil.




Forma del pico: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.




# 09739 Identificación de cogujadas



Tono del plumaje: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Longitud de primarias: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.



Diseño del moteado del pecho: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Color de las infracoberteras alares: izquierda cogujada común; derecha cogujada montesina.



Diseño del ala: arriba cogujada común; abajo cogujada montesina.