

313 Bisbita pratense

Pon tu logo aquí



Bisbita pratense. Adulto (28-XII).

BISBITA PRATENSE (*Anthus pratensis*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Partes superiores pardo-oliva, con manchas oscuras; partes inferiores blancas con listas en el pecho que siguen por los flancos sin variar su forma; base del pico amarillenta; plumas externas de la cola con mancha blanca; patas claras.



Bisbita pratense. Diseño de la cabeza, cola, flanco y patas.



Bisbita alpino



Bisbita campestre



Bisbita arboreo



SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño puede ser de ayuda en casos extremos: **macho** con ala mayor de 82 mm; **hembra** con ala menor de 77 mm.

ESPECIES SIMILARES

Las patas oscuras del **bisbita alpino** lo separan sin dificultad; de los bisbitas con patas claras, el **bisbita arboreo** tiene la uña posterior corta, base del pico rosado y las estrías del flanco más finas que las del pecho; el **bisbita campestre** es de color arenoso y carece de estrías en los flancos.

313 Bisbita pratense


Pon tu logo aquí

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad: **1º año otoño/2º año invierno** con límite de muda en las plumas del ala entre las cambiadas, de borde ante y nuevas, y las no mudadas, más claras y desgastadas (a menudo el límite está entre las pequeñas y medianas coberteras); plumas de la cola desgastadas; punta de la 9ª primaria puntiaguda.

Adulto en **invierno** con aspecto similar a los ejemplares de **1º/2º año**, pero tienen todas las plumas del ala de la misma generación; plumas de la cola nuevas; punta de la 9ª primaria redondeada.

CUIDADO: después de la muda **prenupcial**, datar la edad es muy difícil ya que ambas clases de edad tienen plumas de varias generaciones.




Bisbita pratense. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la 9ª primaria: arriba adulto; abajo 1º año.



Bisbita pratense. Determinación de la edad. Diseño de pequeñas y medianas coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales y un número variable de coberteras del ala (todas o parte de las pequeñas, de ninguna a todas las medianas, de ninguna a algunas grandes coberteras internas), algunos ejemplares extienden su muda a algunas terciarias y el par central de plumas de la cola; terminada en octubre. De enero a marzo, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** cambiando plumas corporales y algunas pequeñas, medianas o grandes coberteras internas, generalmente todas las terciarias y algunas plumas de la cola.



Bisbita pratense. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie invernante muy común repartida por toda la Comunidad en zonas de cultivos y áreas abiertas.



Bisbita pratense. 1º año (28-XII).

313 Bisbita pratense

Pon tu logo aquí



Bisbita pratense. Diseño de la cabeza: arriba adulto (28-XII); abajo 1º año (28-XII).



Bisbita pratense. Desgaste de la cola: izquierda adulto (28-XII); derecha 1º año (28-XII).



Bisbita pratense. Diseño del pecho: izquierda adulto (28-XII); derecha 1º año (28-XII).




Bisbita pratense. Diseño de primarias: arriba adulto (28-XII); abajo 1º año (28-XII).



Bisbita pratense. Diseño del dorso: izquierda adulto (28-XII); derecha 1º año (28-XII).

313 Bisbita pratense

Pon tu logo aquí



Bisbita pratense. Diseño de terciarias: izquierda adulto (28-XII); derecha 1º año (28-XII).



Bisbita pratense. Adulto: diseño del ala (28-XII).



Bisbita pratense. 1º año: diseño del ala (28-XII).



Bisbita pratense. Adulto: diseño de coberteras del ala (28-XII).



Bisbita pratense. 1º año: diseño de coberteras del ala (28-XII).