

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Macho (26-IV).



Lavandera cascadenña. Invierno

LAVANDERA BOYERA (*Motacilla flava*)

IDENTIFICACIÓN

16-17 cm. Plumaje amarillento en las partes inferiores; pardo-oliva en las superiores; cola larga, parda con blanco en los bordes; patas oscuras. En la subespecie **iberiae**, macho en plumaje **nupcial** con la cabeza de color gris con ceja blanca. **Hembras** y **juveniles** son más apagados.



Lavandera boyera. Diseño de las partes superiores y patas.



SEXO

Con plumaje **nupcial**, macho con píleo gris-azulado; lista superciliar blanca; partes inferiores amarillo brillante. **Hembra** con píleo gris-pardo; lista superciliar blanco apagado; partes inferiores amarillo claro con moteado oscuro en el pecho. Después de la muda **postnupcial**, macho con las partes inferiores amarillo vivo y píleo gris-azulado; **hembra** con garganta y pecho blanco ante; partes inferiores amarillo apagado. Después de la muda **postjuvenil**, los machos de **1º año** son muy parecidos a la **hembra adulta**, por lo que es necesario establecer primero la edad correctamente; el macho de **1º año** tiene las partes inferiores más amarillas que las **hembras de 1º año**, que tiene las partes inferiores blanquecinas. **CUIDADO:** los machos de las últimas nidadas mudan más tarde y pueden semejar **hembras**.



Lavandera boyera. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



ESPECIES SIMILARES

De diseño muy parecido a la **lavandera cascadenña**, que tiene el dorso gris y patas claras.

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo, colores apagados; pecho con un collar oscuro estrecho.

1º año otoño con límite de muda entre las grandes coberteras y terciarias nuevas mudadas y las plumas gastadas **juveniles** de color blanquecino; si no han mudado ninguna gran cobertera, el límite está entre las medianas y pequeñas coberteras; si han cambiado todas las grandes coberteras el límite de muda está entre terciarias; plumas de la cola desgastadas; a veces sin amarillo.

2º año primavera similar al **adulto**, por lo que sólo es posible determinar la edad en los ejemplares que conservan grandes coberteras **juveniles** que estén tan poco desgastadas que muestren los bordes blancos de la punta.

Adulto en **otoño** sin límite de muda; con las plumas de vuelo nuevas y con borde y punta de grandes coberteras oliva-amarillento; en **primavera** con grandes coberteras con borde poco marcado y no blanco.

CUIDADO: después de la muda **prenupcial**, no siempre es posible datar la edad.



Lavandera boyera. Otoño. Determinación de la edad y sexo. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Lavandera boyera. Primavera. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Lavandera boyera. Otoño. Determinación de la edad y sexo. Adulto. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda macho; derecha hembra.



Lavandera boyera. Otoño. Determinación de la edad y sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Lavandera boyera. Otoño. Determinación de la edad y sexo. 1º año. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda macho; derecha hembra.

316 Lavandera boyera


Pon tu logo aquí

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia finales de septiembre; algunos ejemplares pueden detener la muda y terminarla en sus cuarteles de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras; algunos ejemplares pueden cambiar algunas o todas las grandes coberteras y alguna o todas las terciarias; suele estar terminada a primeros de septiembre. Entre febrero y abril, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** en la que adquieren el plumaje nupcial, cambiando todas o algunas grandes coberteras más internas, terciarias y plumas de la cola.



Lavandera boyera. Primavera. 2º año. Macho (02-IV)



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Lavandera boyera. Extensión de la muda postjuvenil.



Lavandera boyera. Primavera. 2º año. Hembra (02-IV)

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, con importante paso migratorio en la Comunidad. Nidifica de forma dispersa y discontinua por todo Aragón.



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Hembra (26-IV)



Lavandera boyera. Primavera. Juvenil (30-VII)

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (26-IV); abajo hembra (26-IV).



Lavandera boyera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (02-IV); arriba derecha 2º año hembra (02-IV); izquierda juvenil (30-VII).



Lavandera boyera. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (02-IV); centro 2º año hembra (02-IV); abajo juvenil (30-VII).



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (26-IV).



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (26-IV).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (02-IV); arriba derecha 2º año hembra (02-IV); izquierda juvenil (30-VII).



Lavandera boyera. Primavera. Diseño de las partes inferiores: arriba izquierda 2º año macho (02-IV); arriba derecha 2º año hembra (02-IV); izquierda juvenil (30-VII).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Diseño de las partes inferiores: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (26-IV).



Lavandera boyera. Primavera. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda 2º año macho (02-IV); arriba derecha 2º año hembra (02-IV); izquierda juvenil (30-VII).



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (26-IV).



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (02-IV).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (22-IV).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Macho (01-IX).



Lavandera boyera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (22-IV).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Hembra (14-IX).



Lavandera boyera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (02-IV).



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Macho (14-XI).



Lavandera boyera. Primavera. Juvenil: diseño del ala (30-VII).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Hembra (14-IX).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (14-IX).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (14-IX); abajo hembra (01-IX).



Lavandera boyera.. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (01-IX); abajo hembra (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Diseño de infra-coberteras de la cola: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (27-VIII).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Otoño. Diseño de infracoberteras de la cola. 1º año: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (01-IX).



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (27-VIII); derecha hembra (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Diseño de las partes inferiores: izquierda macho (01-IX); derecha hembra (27-VIII).

316 Lavandera boyera

Pon tu logo aquí



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Diseño de las partes inferiores: izquierda macho (14-IX); derecha hembra (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (27-VIII).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (01-IX).



Lavandera boyera. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (27-VIII).