

Acentor común. Adulto (06-I).

ACENTOR COMÚN (Prunella modula-ris)

IDENTIFICACIÓN

13-15 cm. Cabeza, cuello y pecho grises; dorso pardo con rayas; abdomen blancuzco.





Acentor común. Diseño de cabeza, pecho y dorso.



ESPECIES SIMILARES

La única especie que muestra esa combinación de dorso rayado y cabeza gris es el **acentor alpino**, con "babero" rayado y flancos castaños.



SEXO

El **macho** suele tener gris más intenso en la cabeza y garganta que la **hembra**, pero la diferencia es tan sutil que no tiene valor como criterio de separación debido al solapamiento.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; cabeza y pecho moteados; iris gris.

1º año otoño/2º año primavera con grandes coberteras juveniles no mudadas con manchas claras en la punta de ambas barbas y nítida mancha negra en el centro de la punta; si hay grandes coberteras internas mudadas, entonces con manchas claras poco nítidas oscureciéndose hacia la punta central negra; plumas del álula no mudadas de color mate; pico con base de la mandíbula inferior más clara; plumas de la cola puntiagudas; iris pardo oscuro (CUIDADO: algunos juveniles adquieren ya el tono rojizo del iris a primeros de octubre).

Adulto con todas las plumas del ala de la misma generación; grandes coberteras externas con manchas claras en la punta, mientras las internas no tienen mancha clara o es pequeña; plumas del álula oscuras; iris pardo-rojizo; pico oscuro; plumas de la cola redondeadas.





Acentor común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.





Acentor común. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.





Acentor común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales y las pequeñas y medianas coberteras del ala, si bien algunos ejemplares la pueden extender a un número variable de grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola; generalmente terminada a finales de septiembre.





Acentor común. Determinación de la edad. Color del iris y base del pico: arriba adulto; centro 1º año; abajo juvenil.





FENOLOGÍA



ESTATUS EN ARAGÓN

Especie nidificante en áreas de montaña con desplazamientos a zonas más bajas en invierno, que reciben también aves europeas.





Acentor común. 1º año (02-XII).







Acentor común. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (01-XI); arriba derecha 1º año (02-XII); izquierda juvenil (18 -VII).




Acentor común. Juvenil (18-VII)






















Acentor común. Diseño de las patas: izquierda adulto (06-XII); derecha juvenil (18-VII).



Acentor común. Adulto: diseño del álula (06-XII).







Acentor común. 1º año: diseño del álula (02-XII).



Acentor común. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (06-I); arriba derecha 1º año (02-XII); izquierda juvenil (18 -VII).



Acentor común. Juvenil: diseño del álula (18-VII).



Acentor común. Adulto: diseño del ala (06-XII).



Acentor común. 1º año: diseño del ala (02-XII).



Acentor común. Juvenil: diseño del ala (18-VII).