

Collalba gris. Primavera. Adulto. Macho (01-V).

COLLALBA GRIS (*Oenanthe oenanthe*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. **Macho** con dorso gris; alas negras; frente blanca y bandas negras a los lados de la cabeza; partes inferiores blancas. **Hembra** de dorso pardo grisáceo; alas pardas; partes inferiores cremosas. Ambos sexos tiene la cola con las plumas centrales negras y banda terminal oscura; 10^a primaria igual o menor que las coberteras primarias; 7^a a 8^a primarias emarginadas.

Collalba gris. Primavera. Macho: diseño del dorso






Collalba gris. Hembra: diseño de la cabeza, cola y fórmula alar

ESPECIES SIMILARES

Macho inconfundible con dorso gris; **hembra** parecida a la **collalba rubia**, que tiene la banda negra de la cola más ancha en los laterales; la $10^{\rm a}$ primaria puede ser mayor que las coberteras primarias; tiene emarginadas de la $6^{\rm a}$ a la $8^{\rm a}$ primarias.



SEXO

Macho con plumas auriculares negras; lista superciliar de color blanco; plumas de vuelo y coberteras alares negras. **Hembra** con plumas auriculares pardas; lista superciliar de color crema; plumas de vuelo y coberteras alares pardas. Los **juveniles** y aves de **1º año** no se pueden sexar atendiendo al diseño del plumaje.





Collalba gris. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.






Collalba gris. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.





Collalba gris. Otoño. Determina ción del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.





Collalba gris. Otoño. Determinación del sexo. Diseño de coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con el plumaje nuevo; dorso con moteado claro; plumas de las partes inferiores con borde oscuro; interior de la mandíbula superior amarillento.

1º año otoño con límite de muda a veces dificil de ver por cambiar pocas plumas; revisar diferencias entre las medianas coberteras más oscuras y las grandes más claras; a veces el límite de muda está entre las grandes coberteras más internas y las externas; con amarillo en el interior de la mandíbula superior.

2º año primavera con grandes coberteras externas y plumas de vuelo y cola decoloradas y muy desgastadas; algunos ejemplares todavía con un poco de amarillo en el interior de la mandíbula superior.

Adulto en otoño sin límites de muda en las plumas del ala; en primavera con grandes coberteras externas y plumas de vuelo y cola menos desgastadas que en las aves de 2º año; siempre con el interior de la mandíbula superior oscuro.

(CUIDADO: en primavera, después de la muda prenupcial, datar la edad de las hembras puede resultar difícil debido a que puede haber límites de muda tanto en aves de 2º año como en adultos).





Collalba gris. Determinación de la edad. Desgaste del plumaje: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

Pon tu sitio web aquí Página 2





Collalba gris. Primavera. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 2º año.





Collalba gris. Primavera. Macho. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.





Collalba gris. Primavera. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.






Collalba gris. Otoño. Determinación de la edad. Interior de la mandíbula superior: izquierda adulto; derecha juvenil/1º año.


MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras alares, ampliándose en algunos ejemplares a terciarias y grandes coberteras más internas; terminada a primeros de octubre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales y puede ampliarse a unas pocas grandes coberteras internas y algunas pequeñas y medianas coberteras o terciarias.



Collalba gris. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA



ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival repartida por todo Aragón, faltando únicamente en las zonas de relieve irregular del centro de la Comunidad.



Collalba gris. Primavera. Adulto. Hembra (03-IV).



Collalba gris. Primavera. Juvenil (22-VI)



Collalba gris. Primavera. 2º año. Macho (20-VI).



Collalba gris. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (01-V); abajo hembra (03-IV).



Collalba gris. Primavera. 2º año. Hembra (20-VI).





Collalba gris. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (20-VI); centro 2º año hembra (20-VI); abajo juvenil (16-VII).





Collalba gris. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (01-V); derecha hembra (03-IV).













Collalba gris. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (20-VI); arriba derecha 2º año hembra (20-VI); izquierda juvenil (16-VÍÌ).





Collalba gris. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (01-V); derecha hembra (03-IV).





Collalba gris. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (01-V); derecha hembra (03-IV).







Collalba gris. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (28-IV).



Collalba gris. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (20-VI); arriba derecha 2º año hembra (20-VI); izquierda juvenil (16-VII).



Collalba gris. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (03-IV).







Collalba gris. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (20-VI).



Collalba gris. Primavera. Color del interior de la mandíbula superior: arriba izquierda adulto/2º año (14-IV); arriba derecha 2º año (14-IV); izquierda juvenil (16-VII)..



Collalba gris. Primavera. $2^{\rm o}$ año. Hembra: diseño del ala (20-VI).



Collalba gris. Primavera. Juvenil: diseño del ala (22-VI).




Collalba gris. Otoño. 1º año (02-IX)



Collalba gris. Otoño. Adulto. Macho (02-IX)







Collalba gris. Otoño. Adulto. Hembra (02-IX)











Collalba gris. Otoño. Diseño del pecho: arriadulto ba izquierda macho (02-IX); arriba derecha adulto hembra (02-IX); izquierda 1º año (02-IX).





Collalba gris. Otoño. Color del interior de la mandíbula superior: izquierda adulto (02-IX); derecha 1º año (02-IX).









Collalba gris. Otoño. Desgaste de la cola: izquierda adulto (02-IX); derecha 1º año (02-IX).



Collalba gris. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (02-IX); arriba derecha adulto hembra (02-IX); izquierda 1º año (02-IX).



Collalba gris. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (02-IX).



Collalba gris. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala $(02\text{-}\mathrm{IX})$.



Collalba gris. Otoño. 1º año: diseño del ala (02-IX).