

351 Buscarla pintoja

Pon tu logo aquí



Buscarla pintoja. Primavera. Adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal).

BUSCARLA PINTOJA (*Locustella naevia*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Dorso pardo-oliva, listado de negro; alas pardo oscuro; cola redondead con barreado difuso; partes inferiores claras; patas rosadas.




Buscarla pintoja. Diseño de cabeza y dorso.

ESPECIES SIMILARES


Entre las aves pardas de similar tamaño, sólo el **carricerín común** y el **carricerín cejudo** tienen un moteado parecido, pero se separan con facilidad por su ceja blanca.



Carricerín común



Carricerín cejudo



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD



Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; iris gris oscuro.

2º año primavera en ejemplares con plumas de vuelo y/o coberteras primarias **juveniles** retenidas. **CUIDADO:** estas plumas retenidas están a menudo solo ligeramente decoloradas y son difíciles de encontrar.

Adulto en otoño con plumas de la cola y vuelo desgastadas (**CUIDADO:** si ha comenzado la muda, entonces con algunas plumas nuevas); iris rojizo.

CUIDADO: en **primavera**, los ejemplares con muda **prenupcial** completa son **adultos** pero no se puede datar la edad con seguridad ya que también se incluye una proporción desconocida de aves de **2º año**.



Buscarla pintoja. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.

351 Buscarla pintoja

Pon tu logo aquí

MUDA

Muda **postnupcial** parcial de extensión variable, que puede abarcar desde solo algunas plumas corporales hasta parte de las plumas de vuelo y cola. Aparentemente no hay muda **postjuvenil**. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** en sus áreas de invernada, que es completa en **adultos** y en una pequeña proporción de aves de **2º año** e incompleta en un alto porcentaje de aves de **2º año** que pueden retener un número variable de primarias, secundarias y/o coberteras primarias.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie en paso, asociada a vegetación de zonas húmedas como carrizales y tamarizales.



Buscarla pintoja. Primavera. 2º año ().



Buscarla pintoja. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal); abajo 2º año ().



Buscarla pintoja. Primavera. Diseño del pecho: izquierda adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal); derecha 2º año ().



Buscarla pintoja. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 2º año ().



Buscarla pintoja. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal); derecha 2º año ().

351 Buscarla pintoja

Pon tu logo aquí



Buscarla pintoja. Primavera. Adulto/2º año: diseño del ala (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal).



Buscarla pintoja. Otoño. Adulto con muda extensa (10-IX).



Buscarla pintoja. Primavera. 2º año: diseño del ala (07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Buscarla pintoja. Otoño. Juvenil (24-VIII)



Buscarla pintoja. Otoño. Adulto poco mudado (22-VIII)



Buscarla pintoja. Otoño. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto poco mudado (22-VIII); centro adulto con muda extensa (10-IX); abajo juvenil (24-VIII).

351 Buscarla pintoja

Pon tu logo aquí



Buscarla pintoja. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto poco mudado (22-VIII); arriba derecha adulto con muda extensa (10-IX); izquierda juvenil (24-VIII).




Buscarla pintoja. Otoño. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto poco mudado (22-VIII); arriba derecha adulto con muda extensa (10-IX); izquierda juvenil (24-VIII).



Buscarla pintoja. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto poco mudado (22-VIII); arriba derecha adulto con muda extensa (10-IX); izquierda juvenil (24-VIII).



Buscarla pintoja. Otoño. Adulto poco mudado: diseño del ala (22-VIII).



Buscarla pintoja. Otoño. Adulto con muda extensa: diseño del ala (10-IX).

351 **Buscarla pintoja**

[Pon tu logo aquí](#)



Buscarla pintoja. Otoño. Juvenil: diseño del ala (24-VIII)