

354 Carricerín real

Pon tu logo aquí



Carricerín real. Primavera (10-III).

CARRICERÍN REAL (*Acrocephalus melanopogon*)**IDENTIFICACIÓN**

11-13 cm. Dorsal pardo-rojizo, rayado de negro; obispillo y nuca lisos; ceja blanca muy marcada; capirote oscuro; partes inferiores blancas, con garganta ocre; cola de color pardo con bordes



Carricerín real. Diseño de cabeza y píleo.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda un **carricero común**, que no tiene la cabeza listada. Más parecido al **carricerín cejudo**, que tiene una lista blanca a lo largo del píleo, y al **carricerín común**, que tiene el píleo rayado de oscuro, ceja blanca más estrecha y garganta ocre.




Carricero común



Carricerín común



Carricerín cejudo

**SEXO**

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.


EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris marrón-oliva; interior de la mandíbula superior amarillo; 10ª primaria con punta ancha; con dos puntos negros en la lengua.

Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris marrón-rojizo; interior de la mandíbula superior anaranjado; 10ª primaria con punta estrecha; sin puntos negros en la lengua.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Carricerín real. Verano. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

354 Carricerín real

Pon tu logo aquí



Carricerín real. Verano. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Carricerín real. Verano. Determinación de la edad. Color del interior de la boca: izquierda adulto; derecha juvenil.



Carricerín real. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la 10ª primaria: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria con escasas citas invernales en diferentes zonas húmedas de la Comunidad. Comprobada su cría en la laguna de Sariñena.



Carricerín real. Verano. Adulto (02-VI).





Carricerín real. Verano. Juvenil (02-VI).

354 Carricerín real


Pon tu logo aquí



Carricerín real. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba en primavera (10-III); centro adulto en verano (02-VI); abajo juvenil (02-VI).



Carricerín real. Diseño del capirote: arriba izquierda en primavera (10-III); arriba derecha adulto en verano (02-VI); izquierda juvenil (02-VI).



Carricerín real. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (10-III); arriba derecha adulto en verano (02-VI); izquierda juvenil (02-VI).



Carricerín real. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (10-III); arriba derecha adulto en verano (02-VI); izquierda juvenil (02-VI).

354 Carricerín real

Pon tu logo aquí



Carricerín real. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (10-III); arriba derecha adulto en verano (02-VI); izquierda juvenil (02-VI).



Carricerín real. Primavera: desgaste de primarias y diseño de la 10ª primaria (10-III).



Carricerín real. Verano. Adulto: desgaste de primarias y diseño de la 10ª primaria (02-VI).



Carricerín real. Verano. Juvenil: desgaste de primarias y diseño de la 10ª primaria (02-VI).



Carricerín real. Primavera: diseño del ala (10-III).

354 Carricerín real

[Pon tu logo aquí](#)



Carricerín real. Verano. Adulto: diseño del ala (02-VI).



Carricerín real. Verano. Juvenil:: diseño del ala (02-VI).