356 Carricerín común

Pon tu logo aquí

Carricerín común. Primavera (24-III).

Carricerín real

Carricerín cejudo

CARRICERIN COMÚN (*Acrocephalus schoenobaenus*)

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Dorso pardo rojizo, marcadamente listado; partes inferiores blanco amarillentas; obispillo leonado; ceja clara bien marcada; capirote rayado de oscuro.

Carricerín común. Diseño de cabeza y píleo.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda un **carricero común**, que no tiene la cabeza listada. Más parecido al **carricerín cejudo**, que tiene una lista blanca a lo largo del píleo (**CUIDADO:** algunos **juveniles** de **carricerín común** pueden presentar una lista blanca en el píleo hasta que hacen su muda **postjuvenil**), y al **carricerín real**, que tiene el píleo casi negro, ceja blanca más ancha y garganta blanca.

Carricero común

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:
Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris marrón oscuro; pecho con puntos pardo oscuro.
Adulto en **otoño** con plumaje desgastado; iris marrón claro o rojizo; pecho liso, sin motas.
En **primavera**, después de las mudas **postnupcial/postjuvenil**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Carricerín común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

356 Carricerín común

Pon tu logo aquí





Carricerín común. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.





Carricerín común. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; deecha juvenil.

MUDA

Partial **postbreeding** moult involving in breeding areas body feathers and sometimes inner greater coverts and some tail and flight feathers, finished in wintering sites. No **postjuvenile** moult (or just some body feathers) in breeding areas but complete in winter quarters.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie presente sólo en los pasos migratorios, siendo común en las zonas de vegetación palustre del valle del Ebro y zonas aledañas.

Carricerín común. Otoño. Adulto (25-VIII).

Carricerín común. Otoño. Juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).

356 Carricerín común

Pon tu logo aquí







Carricerín común. Diseño del capirote: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).

Carricerín común. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba en primavera (30-III); centro adulto en otoño (25-VIII) adultos; abajo juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Desgaste del plumaje: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).

Carricerín común. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).

356 Carricerín común

Carricerín común. Primavera: diseño del ala (24-III).

Carricerín común. Otoño. Adulto: diseño del ala (25 -VIII).

Carricerín común. Otoño. Juvenil: diseño del ala (13 -VIII).