

359 Carricero común

Pon tu logo aquí



Buscarla unicolor



Carricero común. Primavera (26-IV).

CARRICERO COMÚN (*Acrocephalus scirpaceus*)

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Dorso pardo, con tinte rojizo en el obispillo; partes inferiores blanco ocráceo, con garganta blancuzca; cola pardo uniforme; axilares beige; patas de color pardo claro; con cerdas en la comisura de la boca.



Carricero común. Diseño de axilares y cerdas de la comisura de la boca.

ESPECIES SIMILARES

Similar al **carricero tordal**, que es mucho más grande (longitud 16-20 cm); de igual tamaño son la **buscarla unicolor**, que carece de cerdas en la comisura de la boca; el **zarcero común** con las axilares de color amarillento.



Carricero tordal



Zarcero común



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris gris oscuro; patas de color gris-azulado; con puntos negros en la lengua.


2º año solo en algunos ejemplares con iris de color pardo-oliva.

Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris pardo o pardo rojizo; patas pardo claro; lengua sin puntos negros.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.

359 Carricero común

Pon tu logo aquí




Carricero común. Determinación de la edad. Color del ojo: arriba adulto; centro 2º año; abajo juvenil.

Carricero común. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, que incluyen plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras alares; a veces también algunas grandes coberteras y el par central de plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.



Carricero común. Extensión de la muda postnupcial y postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival repartida por toda la Comunidad, ligada a cursos de ríos y zonas de regadío con acequias y estanques.



Carricero común. Otoño. Adulto (28-VIII).



Carricero común. Otoño. Juvenil (25-VII).

359 Carricero común

Pon tu logo aquí



Carricero común. Color del iris: arriba adulto (28-VIII); centro 2º año (31-VII); abajo juvenil (25-VII).



Carricero común. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (22-IV); arriba derecha adulto en otoño (28-VIII); izquierda juvenil (25-VII).



Carricero común. Desgaste de la cola: arriba izquierda en primavera (26-IV); arriba derecha adulto en otoño (28-VIII); izquierda juvenil (25-VII).



Carricero común. Desgaste del dorso: arriba izquierda en primavera (26-IV); arriba derecha adulto en otoño (28-VIII); izquierda juvenil (25-VII).



Carricero común. Otoño. Color de las patas: izquierda adulto(28-IV); derecha juvenil (21-VII).

359 Carricero común

Pon tu logo aquí



Carricero común. Primavera: diseño del ala (26-IV).



Carricero común. Otoño. Adulto: diseño del ala (28-VIII).



Carricero común. Otoño. Juvenil: diseño del ala (25-VII).