

366 *Curruca tomillera*

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Macho (24-IV).

CURRUCA TOMILLERA (*Curruca conspicillata*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm; ala entre 50-60 mm. **Macho** con cabeza gris y mancha negra junto al ojo; dorso pardo; partes inferiores rosadas; anillo ocular blanco. **Hembra** más apagada que el macho, sin gris o con poco en la cabeza; partes inferiores blancuzcas. Ambos sexos tienen las plumas de las alas con amplios bordes ocre y patas claras. Los **juveniles** son parecidos a la **hembra**, sin gris y con las partes inferiores cremosas.



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Macho: diseño de la cabeza.



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de la cabeza y dorso



Curruca tomillera. Juvenil: diseño de la cabeza y dorso

ESPECIES SIMILARES

Podría haber confusión con la **curruca zarcera**, de igual diseño alar pero de tamaño mayor (13-15 cm.; ala 69-72 mm.) y la **curruca carrasqueña**, de garganta rojiza (el macho) y alas grises. Los **juveniles** son muy similares a los de la **curruca zarcera**, de mayor tamaño, y a los de la **curruca carrasqueña** y **curruca cabecinegra**, que carecen de las alas con borde ante tan intenso.




Curruca zarcera. Hembra



Curruca carrasqueña. Hembra

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca zarquera. Juvenil

SEXO

En **primavera**, **macho** con la cabeza gris y máscara frontal negra; pecho rosado. **Hembra** con colores más apagados; sin gris; con pecho y flancos ante, no rosados (**CUIDADO**: algunas **hembras** tienen gris en la cabeza, si bien menos extenso que en el **macho**).

En **otoño**, después de mudar, **adultos** como en **primavera** pero el gris de la cabeza está atenuado por las puntas ante de las plumas; **1º año macho** con cabeza más gris que **1º año hembra** pero muy similar a la **hembra adulta**, por lo que es importante determinar correctamente la edad; el color ante de las coberteras del ala más apagado y delgado en la **hembra** que en el **macho**.



Curruca carrasqueña. Juvenil



Curruca tomillera. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; centro y abajo hembras.



Curruca cabecinegra. Juvenil



Curruca tomillera. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

366 *Curruca tomillera*

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; centro y abajo hembras.



Curruca tomillera. Otoño. Determinación del sexo. Color de las coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; cabeza marrón claro, sin gris; iris de color oscuro.

1º año otoño con límite de muda en el ala entre las grandes coberteras cambiadas, nuevas y con borde ante ancho, y las coberteras primarias juveniles retenidas, más apagadas y con bordes ante claro; iris oscuro.

2º año primavera con las plumas de vuelo juveniles retenidas muy desgastadas; coberteras primarias desgastadas; si han retenido alguna pluma juvenil en la cola está muy desgastada. En machos gris de la cabeza menos intenso que en adultos; ojo rojo apagado. **CUIDADO:** el color del iris en las hembras es muy variable.

Adulto en otoño con las plumas del ala de la misma generación. En primavera, con las plumas de vuelo y coberteras primarias poco gastadas. En machos gris de la cabeza muy intenso; ojo rojizo. Algunas hembras tienen la cabeza grisácea y ojos rojizos. **CUIDADO:** en primavera, después de la muda prenupcial, ambos tipos de edad muestran límites de muda en el ala.

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Curruca tomillera. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto hembra; abajo 1º año..




Curruca tomillera. Primavera. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; abajo 2º año..



MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, generalmente todas las grandes coberteras y algunas terciarias y plumas de la cola; hay ejemplares que pueden mudar toda el ala conservando si acaso las coberteras primarias más externas; generalmente terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales, algunas grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola; raramente alguna secundaria interna también.



Curruca tomillera. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival. Es una especie mediterránea repartida por todo Aragón, evitando sólo la alta montaña y las zonas deforestadas.

Curruca tomillera. Primavera. Determinación de la edad. Desgaste de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

366 *Curruca tomillera*

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Hembra con diseño pardo (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. 2º año. Hembra (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Hembra con diseño gris (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. Juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (24-IV); centro hembra con diseño pardo (02-V); abajo hembra con diseño gris (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. 2º año. Macho (02-V).

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año macho (02-V); centro 2º año hembra (02-V); abajo juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (02-V); izquierda juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (24-IV); arriba derecha hembra con diseño pardo (02-V); izquierda hembra con diseño gris (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (24-IV); arriba derecha hembra con diseño pardo (02-V); izquierda hembra con diseño gris (02-V).

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (02-V); izquierda juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (02-V); izquierda juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (24-IV); arriba derecha hembra con diseño pardo (02-V); izquierda hembra con diseño gris (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. Color de las patas: izquierda adulto (13-IV); derecha juvenil (28-VI).

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (24-IV); derecha hembra (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (02-V); izquierda juvenil (28-VI).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (24-IV).



Curruca tomillera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (02-V).



Curruca tomillera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (02-V).

366 *Curruca tomillera*

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Primavera. Juvenil: diseño de ala (28-VI).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Hembra con diseño gris (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Macho (22-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Macho (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Hembra con diseño pardo (22-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Hembra (13-VIII).


366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (22-VIII); centro hembra con diseño pardo (22-VIII); abajo hembra con diseño gris (13-VIII).

Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (13-VIII); abajo hembra (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra con diseño pardo (22-VIII); izquierda hembra con diseño gris (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (13-VIII); derecha hembra (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra con diseño pardo (22-VIII); izquierda hembra con diseño gris (13-VIII).

366 Curruca tomillera

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (13-VIII); derecha hembra (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (13-VIII); derecha hembra (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra con diseño pardo (22-VIII); izquierda hembra con diseño gris (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (13-VIII); derecha hembra (13-VIII).

366 *Curruca tomillera*

Pon tu logo aquí



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (13-VIII); derecha hembra (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (13-VIII).



Curruca tomillera. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (13-VIII).