



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Macho (26-IV).

IDENTIFICACIÓN


13-15 cm. Dorso de tonos pardos y partes inferiores claras, más blancas en la garganta; coberteras del ala, terciarias y secundarias con reborde pardo-rojizo; cola parda, con las plumas externas en parte blancas; patas y pico pardo claro. **Macho nupcial** con cabeza grisácea; **macho no nupcial, hembra y juveniles** con cabeza parda. Ala 66-77 mm.



Curruca zarcera. Diseño de la cabeza, cola y dorso.

ESPECIES SIMILARES

Podría haber confusión con la **curruca tomillera**, de igual diseño alar pero de tamaño menor (12-13 cm.; ala 53-57 mm.).



Curruca tomillera.
Hembra.

SEXO

En **primavera**, **macho adulto** con cabeza gris; garganta blanca; pecho con tinte rosado; iris amarillo marrón; pequeñas coberteras con centro gris. **Hembra** (principalmente de **2º año**) con cabeza sin gris; garganta blanquecina; pecho sin tinte rosado; iris grisáceo; pequeñas coberteras con centro marrón. **Hembra adulta** similar al **macho de 2º año** con cabeza marrón teñida de gris; garganta blanquecina; iris pardo; pecho crema ante o con ligero tinte rosado; pequeñas coberteras del ala con centro gris marrón. (**CAUTION**: existiendo muchos ejemplares intermedios, esta especie se puede sexar con seguridad sólo en los casos extremos).

En **otoño** sexos muy similares, siendo su datación muy difícil y solo posible en algunos **machos** extremos con gris en la base de las plumas del púleo; tinte rosado en el pecho; iris naranja marrón; pequeñas coberteras con centro gris. Los ejemplares con otra apariencia pueden ser indistintamente **macho** o **hembra**. Los **juveniles** y aves de **1º año** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Curruca zarce-
ra. Determina-
ción del sexo.
Diseño de la
cabeza y color
del iris:
arriba macho;
abajo hembra.



Curruca zarcera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Curruca zarce-
ra. Determina-
ción del sexo.
Diseño de las
pequeñas co-
berteras:
arriba macho;
abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; iris grisáceo (carácter útil para datar la edad durante todo el otoño).

1º año otoño con límite de muda en el ala entre las grandes coberteras mudadas, con borde ocre oscuro, y las juveniles retenidas con borde ante claro (**CAUTION**: no hay límite de muda si todas las grandes coberteras se han cambiado o todas están sin mudar); si las plumas externas de la cola permanecen sin mudar, entonces son puntiagudas y con la más externa con tinte marrón y con mal definidos borde blanco; iris marrón gris oscuro.

2º año primavera con coberteras primarias sin mudar, que están muy desgastadas y decoloradas; a veces con grandes coberteras juveniles retenidas, muy desgastadas y decoloradas (**CAUTION**: hay adultos también con límite de muda en grandes coberteras); plumas de vuelo no mudadas desgastadas y decoloradas, sin brillo; si hay plumas de la cola retenidas, entonces muy desgastadas (**CAUTION**: los caracteres descritos no siempre son posibles de apreciar. Algunos ejemplares tienen una muda prenupcial completa siendo indistinguibles de los adultos).

Adulto en otoño con muda postnupcial completa sin límites de muda o, si está suspendida, con contraste en las plumas de vuelo (principalmente en secundarias) entre plumas cambiadas nuevas y retenidas desgastadas y marrones; pluma más externa de la cola redondeada y habitualmente con blanco puro o con punta más clara. En **primavera** con plumas del ala moderadamente nuevas.



Curruca zarce-
ra. Determina-
ción de la
edad. Color
del iris: arriba
adulto; centro
1º año; abajo
juvenil.

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto hembra; derecha 1º año.



Curruca zarcera. Otoño. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. **CUIDADO:** algunos ejemplares detienen la muda antes de la migración para completarla en sus áreas de invernada por lo que presentan plumas de vuelo nuevas y viejas en migración. Muda **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas internas o todas las grandes coberteras y a veces terciarias y algunas plumas de la cola; suele estar terminada en septiembre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** muy variable en extensión que incluye ninguna, alguna o todas las coberteras del ala y ninguna, alguna o la mayor parte de las plumas de vuelo y de la cola.



Curruca zarcera. Extensión de la muda postjuvenil.



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Macho (04-IV).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Hembra (28-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Juvenil (15-VI).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (26-IV); abajo hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año macho (04-IV); centro 2º año hembra (28-IV); abajo juvenil (15-VI).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil (15-VI).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de la base de las plumas del pïleo: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).




Curruca zarcera. Primavera. Diseño de la base de las plumas del pïleo: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil (15-VI).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil (15-VI).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (26-IV); abajo hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba 2º año macho (04-IV); centro 2º año hembra (28-IV); abajo juvenil (15-VI).



12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño y desgaste de la cola: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil (15-VI).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil (15-VI).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (26-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (04-IV).



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (28-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Juvenil: diseño del ala (15-VI).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Otoño. Adulto. Macho (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto. Hembra (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).

Curruca zarcera. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Otoño. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la base de las plumas del píleo: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la pluma externa de la cola: arriba izquierda adulto macho (16-IX); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).

12750 **Curruca zarcera** (*Curruca communis*)



Curruca zarcera. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda completa. Macho: diseño del ala (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda suspendida. Macho: diseño del ala (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda suspendida. Hembra: diseño del ala (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. 1º año: diseño del ala (05-VIII).