




Mosquitero papialbo. Primavera (13-IV).




Mosquitero ibérico.

IDENTIFICACIÓN

10-11 cm. Partes superiores pardo-gris, con tonos verdosos; partes inferiores blancas; obispillo, bordes de coberteras y de las plumas del ala de color amarillo-verdoso; ceja blanca; patas claras.



Mosquitero papialbo. Diseño de pecho y obispillo.




Mosquitero común.

ESPECIES SIMILARES

Las partes inferiores blanco puro lo hacen fácil de separar de los otros mosquiteros como el **mosquitero ibérico** y el **mosquitero común**, que tienen patas oscuras y emarginada desde la 5ª primaria. El **mosquitero musical** tiene patas claras, pero es más amarillo y sin contraste entre el obispillo amarillo y el dorso. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarzero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.



Mosquitero musical.



Mosquitero silbador.



Zarcero común

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con el plumaje nuevo; obispillo amarillento con poco contraste con el dorso.

Adulto con las plumas de la cola y el ala desgastadas (excepto alguna cobertera y pluma de vuelo mudada); obispillo amarillo con marcado contraste con el dorso.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

13070 Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría, que incluye plumas corporales y coberteras del ala; a veces también terciarias y plumas de la cola. La muda **postjuvenil** es parcial, abarcando sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada (**CUIDADO:** ejemplares de ambas edades pueden retener algunas plumas de vuelo no mudadas).

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto (06-VII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (13-IV); centro adulto en otoño (06-VII); abajo juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).

13070 Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)



Mosquitero papialbo. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (22-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Diseño del obispillo: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Primavera: diseño del ala (13-IV).



Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto: diseño del ala (07-VII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil: diseño del ala (10-VIII).