

379 Mosquitero silbador

Pon tu logo aquí




Mosquitero silbador. Primavera (17-IV).

MOSQUITERO SILBADOR (*Phylloscopus sibilatrix*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Partes superiores verdosas, con tinte amarillento; ceja y mejillas amarillas; garganta y pecho amarillos; vientre blanco; patas pardo-amarillo claro; 10ª primaria más corta que las coberteras primarias.




Mosquitero silbador. Diseño de la cabeza y partes inferiores y longitud de la 10ª primaria.

ESPECIES SIMILARES

El tener la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y el contraste entre la ceja, garganta y parte superior del pecho amarillo limón con el vientre blanco puro, hacen a esta especie diferente del resto de los mosquiteros.




Mosquitero musical



Mosquitero común



Mosquitero ibérico



Mosquitero papialbo

379 Mosquitero silbador

Pon tu logo aquí

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

1º año con el plumaje nuevo; plumas del ala y cola con bordes verde-amarillentos.

Adultos con las plumas de la cola y el ala desgastadas; si han mudado grandes coberteras y terciarias, entonces con contraste entre las plumas nuevas y viejas.

En primavera, después de la muda **prenupcial** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: izquierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).

MUDA


Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría que incluye plumas del cuerpo y, a veces, terciarias y algunas grandes coberteras. La muda **postjuvenil** abarca sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada, siendo después indistinguibles por el plumaje.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Estival, con citas de nidificación muy localizadas en hayedos del Pirineo occidental. Raro en época de paso en cualquier lugar de la Comunidad.



Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Otoño. Adulto ().

379 Mosquitero silbador

Pon tu logo aquí




Mosquitero silbador. Otoño. 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).




Mosquitero silbador. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (17-IV); centro adulto en otoño (); abajo 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (14-VIII) (Foto: Frank Bracko); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Diseño de terciarias: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (14-VIII) (Foto: Frank Bracko); izquierda 1º año (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).

379 Mosquitero silbador


Pon tu logo aquí



Mosquitero silbador. Otoño. Adulto: diseño del ala (14-VIII) (Foto: Frank Bracko)



Mosquitero silbador. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (17-IV); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año ().



Mosquitero silbador. Otoño. 1º año: diseño del ala (09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal).



Mosquitero silbador. Primavera: diseño del ala (17-IV).