




Mosquitero común. Primavera. Adulto (20-III).

IDENTIFICACIÓN


11-12 cm. Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocre y amarillos; zona auricular y cuello de tonos marrones-grisáceos; obispillo algo más amarillo que el dorso; patas oscuras; en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª y están emarginadas hasta la 5ª.




Mosquitero común. Diseño del pecho, obispillo, fórmula alar y color de las patas.

ESPECIES SIMILARES

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero ibérico** es de coloración parecida al mosquitero musical; obispillo del mismo color que el dorso y sólo la 7ª y 8ª primaria son iguales. El **mosquitero musical** es más amarillo y con patas claras; tiene emarginada sólo hasta la 6ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.



Mosquitero ibérico.




Mosquitero musical.

13110 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)



Mosquitero papialbo.



Mosquitero silbador.



Zarcero común.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo, sin límites de muda.

1º año otoño/2º año primavera habitualmente con contraste en las grandes coberteras entre las plumas cambiadas nuevas y las más claras juveniles retenidas; si no han cambiado ninguna entonces el límite de muda está entre pequeñas y medianas coberteras; si las han mudado todas el contraste está entre grandes coberteras y coberteras primarias, entre terciarias o entre terciarias y secundarias; revisar también límites de muda en las plumas de la cola (cambian habitualmente el par central).


Adulto en otoño con todas las plumas del ala y cola de la misma generación, sin límites de muda. En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, ambos tipos de edad pueden mostrar límites de muda en el ala y cola, pero **adulto** con plumas de vuelo no mudadas solo ligeramente desgastadas y **2º año** con plumas de vuelo no mudadas fuertemente desgastadas.



Mosquitero común. Determinación de la edad. Límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.




Mosquitero común. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



13110 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele terminar a finales de octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, de ninguna a todas las grandes coberteras, de ninguna a todas las terciarias y de ninguna a todas las plumas de la cola, dejando siempre sin cambiar las coberteras primarias; generalmente terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** variable, entre diciembre y abril, con ejemplares que no mudan y otros que cambian plumas corporales, algunas coberteras del ala, terciarias y plumas de la cola.



Mosquitero común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Mosquitero común. Primavera. 2º año (20-III).



Mosquitero común. Primavera. Juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (20-III); centro 2º año (20-III); abajo juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 2º año (20-III); izquierda juvenil (18-VII).

13110 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)



Mosquitero común. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 2º año (20-III); izquierda juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 1º año con muda prenupcial (20-III); izquierda 1º año con todas las plumas juveniles (20-III); abajo juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. Adulto: diseño del ala (20-III).


13110 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)



Mosquitero común. Primavera. 2º año: diseño del ala (20-III).



Mosquitero común. Otoño. Adulto (01-XI).



Mosquitero común. Primavera. 2º año: diseño del ala (1 muda postjuvenil; 2 muda prenupcial) (20-III).



Mosquitero común. Otoño. 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Primavera. Juvenil: diseño del ala (08-VII).



Mosquitero común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (01-XI); abajo 1º año (30-XI).

13110 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)



Mosquitero común. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-XI); derecha 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (22-X); arriba derecha 1º año con el par central de plumas mudado (02-X); izquierda 1º año con todas las plumas juveniles (10-XI).



Mosquitero común. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (22-X); derecha 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Otoño. Adulto: diseño del ala (22-X).



Mosquitero común. Otoño. 1º año: diseño del ala (30-XI).