

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MOSQUITEROS (GÉNERO *Phylloscopus*).

1 - 10ª primaria más corta que las coberteras primarias; contraste claro entre la garganta amarilla y el vientre blanco puro: mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

10ª primaria más larga que las coberteras prima-

2 - Partes inferiores blanco puro; obispillo amarillento que contrasta nítidamente con el dorso gris: mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)


Partes inferiores amarillentas, pardo-amarillas o blanco sucio 3

3 - Generalmente con patas claras; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud; con emarginación desde la 6ª primaria: mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)


Emarginación desde la 5ª primaria

4 - Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocres y amarillos; zona auricular y cuello de tonos marrones-grisáceos; obispillo algo más amarillo que el dorso; en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª y están emarginadas desde la 5ª: mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)



Partes superiores verde brillante; pecho blanco listado de amarillo; zona auricular clara con estrías amarillas; dorso y obispillo con la misma tonalidad verdosa; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª y están emarginadas




Mosquitero silbador: 10ª primaria más corta que las coberteras primarias; con contraste bien marcado entre la garganta amarilla y el vientre blanco puro.




Mosquitero papialbo: 10ª primaria más larga que las coberteras primarias; partes inferiores blanco puro; obispillo amarillento que contrasta nítidamente con el dorso gris.



Mosquitero musical: 10ª primaria más larga que las coberteras primarias; obispillo del mismo color que el dorso; 7ª y 8ª primarias con la misma longitud; con emarginación desde la 6ª primaria (3 primarias emarginadas).



Mosquitero común: partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón (1); pecho con tonos ocre y amarillos (2); lista superciliar amarilla que raramente sobrepasa el ojo (3); zona auricular y cuello de tonos marrones-grisáceos (4); obispillo algo más amarillo que el dorso (5); infracoberteras caudales amarillas (6); infracoberteras alares amarillas (7); patas negras (8); en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud (9); la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª (10); emarginación desde la 5ª primaria (4 primarias emarginadas) (11).



Mosquitero ibérico: partes superiores verdosas (1); pecho blanco listado de amarillo (2); lista superciliar muy amarilla que sobrepasa el ojo (3); zona auricular clara con estrías amarillas (4); dorso y obispillo con la misma tonalidad verdosa (5); infracoberteras caudales muy amarillas (6); infracoberteras alares muy amarillas (7); patas marrones (8); en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud (9); la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª (10); emarginación desde la 5ª primaria (4 primarias emarginadas) (11).