391 Herrerillo capuchino

Herrerillo capuchino. Primavera. Adulto (03-V).

HERRERILLO CAPUCHINO
(*Lophophanes cristatus*)

IDENTIFICACIÓN
11-12 cm. Partes superiores grises; partes inferiores blancuzcas; garganta negra; cabeza con mejillas claras y lista ocular negra; píleo con "moño" de plumas negras ribeteadas de blanco.

Herrerillo capuchino. Diseño de la cabeza

ESPECIES SIMILARES
No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 63 mm; **hembra** con ala menor de 59 mm.

EDAD
Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juvenil con el plumaje nuevo; plumas de la cola puntiagudas; iris pardo-gris; cresta corta.
1º año otoño/2º año primavera con las rectrices **juveniles** puntiagudas, habitualmente desgastadas desde finales del **otoño**; si se han cambiado algunas grandes coberteras, entonces con límite de muda entre las mudadas internas de color ante-marrón y las externas juveniles retenidas de color pardo apagado; habitualmente el color pardo del iris se mantiene hasta febrero.
Adulto con las plumas de la cola redondeadas; iris rojizo; cresta larga.

Herrerillo capuchino. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; centro 1º año; abajo juvenil.

Herrerillo capuchino. Primavera. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 2º año.

391 Herrerillo capuchino

Pon tu logo aquí



Herrerillo capuchino. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas o todas la grandes coberteras y una o más terciarias; no suelen cambiar plumas de la cola; habitualmente terminada en septiembre.



Herrerillo capuchino. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria asociadas a los pinares y sabinares de la Comunidad, con amplia presencia en los Sistemas montañosos.

Herrerillo capuchino. Primavera. 2º año (03-V)

Herrerillo capuchino. Primavera. Juvenil (02-VII).

Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño de la cabeza y color de los ojos: arriba adulto (03-V); centro 2º año (03-V); abajo juvenil (20-VII).

391 Herrerillo capuchino

Pon tu logo aquí





Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).

Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).

Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).

Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).

391 Herrerillo capuchino

Herrerillo capuchino. Primavera. Adulto: diseño del ala (03-V).

Herrerillo capuchino. Primavera. 2º año: diseño del ala (03-V).

Herrerillo capuchino. Primavera. Juvenil: diseño del ala (02-VII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Adulto (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. 1º año (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño de la cabeza y color de los ojos: arriba adulto (26-XII); abajo 1º año (26-XII).

391 Herrerillo capuchino

Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del píleo: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. Adulto: diseño del ala (26-XII).

Herrerillo capuchino. Otoño. 1º año: diseño del ala (26-XII).