

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí



Herrerillo común. Adulto. Macho (06-I).

HERRERILLO COMÚN (*Cyanistes caeruleus*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Pileo, alas y cola de color azul; dorso verdoso; partes inferiores amarillentas; mejillas y banda del ala blancas.



Herrerillo común. Diseño de la cabeza.

ESPECIES SIMILARES

No existe posibilidad de confusión con ninguna otra especie.

SEXO

Macho con las coberteras del ala con borde azul intenso. **Hembra** con las coberteras del ala con bordes gris azulado (**CAUTION:** existen ejemplares intermedios, principalmente aves de 1º/2º año, en los que no es siempre fácil ver este carácter). En ejemplares extremos, la anchura y color de la banda azul del cuello es un carácter útil para asignar el sexo: **macho** con banda del cuello ancha de color azul-negro; **hembra** con banda del cuello estrecha de color azul-gris. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Herrerillo común. Determinación del sexo. Diseño de la banda oscura del cuello: arriba macho; abajo hembra.



Herrerillo común. Determinación del sexo. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; mejillas amarillo claro; píleo de color gris-azulado; plumas de la cola puntiagudas.

1° año otoño/2° año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras azul intenso cambiadas y las coberteras primarias juveniles retenidas de color azul-gris apagado; a veces con contraste entre terciarias o entre terciarias y secundarias; habitualmente con límite de muda entre el par central de plumas de la cola mudado, nuevo, más azul y con punta redondeada, que contrastan con el resto de plumas de la cola juveniles retenidas, más desgastadas, más grises y con punta aguda.

Adulto con todas las plumas del ala y cola con el mismo borde azul, sin límites de muda; mejillas blancas; píleo azulado; plumas de la cola con punta redondeada.



Herrerillo común. Determinación de la edad. Límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1° año



Herrerillo común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Herrerillo común. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1° año




Herrerillo común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial, incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, generalmente todas las grandes coberteras, algunas terciarias y el par central de plumas de la cola; algunos ejemplares la extienden a parte del álula, a todas las terciarias y desde algunos pares a todas las plumas de la cola; suele estar terminada en octubre.

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí



■ Todos los ejemplares
 ■ Algunos ejemplares

Herrerillo común.
 Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie sedentaria ampliamente distribuida por toda la Comunidad, faltando sólo en las áreas deforestadas.



Herrerillo común. 1º año. Hembra (06-XI).



Herrerillo común. Adulto. Hembra (06-I).



Herrerillo común. Juvenil (18-VI).



Herrerillo común. 1º año. Macho (06-XI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de la cabeza y anchura de la mancha del cuello: arriba macho (06-I); abajo hembra (06-I).

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí



Herrerillo común. Diseño de la cabeza y anchura de la mancha del cuello: arriba 1º año macho (06-XI); centro 1º año hembra (06-XI); abajo juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Diseño del píleo: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí



Herrerillo común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de las coberturas del ala: arriba macho (06-I); abajo hembra (06-I).

393 Herrerillo común

Pon tu logo aquí



Herrerillo común. Adulto. Macho: diseño del ala (06-I).



Herrerillo común. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-I).

Herrerillo común. Diseño de las coberteras del ala: arriba 1º año macho (06-XI); centro 1º año hembra (06-XI); abajo juvenil (18-VI).



Herrerillo común. 1º año. Macho: diseño del ala (06-XI).



Herrerillo común. 1º año. Hembra: diseño del ala (06-XI).



Herrerillo común. Juvenil: diseño de ala (14-VI).