



Oropéndola. Adulto. Macho (24-VI).

IDENTIFICACIÓN


22-25 cm. **Macho** característico con cuerpo amarillo dorado y ala y cola negras. **Hembra** y **juveniles** parecidos, con partes superiores verde-oliva y partes inferiores grises, finamente estriadas; ala y cola pardas; en **adultos** pico rosado y ojo rojo.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial muy variable, cambiando generalmente plumas corporales, algunas coberteras alares internas y pudiendo incluir también algunas secundarias internas y terciarias; habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas coberteras, algunas medianas y grandes coberteras internas y a veces terciarias. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en sus áreas de invernada, pudiendo dejar sin cambiar algunas secundarias



Oropéndola. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso

EDAD Y SEXO

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil y **1º año** con plumaje nuevo; plumas del dorso y coberteras del ala pardo oliva con borde amarillo; partes inferiores nítidamente moteadas; brida gris apagado; pico pardo oscuro; iris pardo oscuro; plumas centrales de la cola puntiagudas. Los ejemplares **juveniles** y de **1º año** no se pueden separar utilizando el diseño del plumaje.

2º año machos y **hembras** mantienen su apariencia de **juveniles** con partes inferiores siempre listadas; plumas centrales de la cola con punta redondeada; iris rojizo. **Macho** generalmente con coberteras primarias con punta clara de 1 a 10 mm; el amarillo de la punta de la pluma de la cola más externa de 24-35 mm; banda malar amarillenta. **Hembra** con coberteras primarias con punta clara de 1 a 5 mm; el amarillo de la punta de la pluma de la cola más externa de 17-28 mm; banda malar clara (**CAUIDADO**: los ejemplares intermedios son muy frecuentes).




Hembra adulta con brida gris oscuro; habitualmente con partes inferiores gris-blanco escasamente listadas y banda malar clara; más raramente hay **hembras** con un diseño parecido al del **macho** con partes inferiores amarillentas solo difusamente moteadas y banda malar amarillenta; se separa del **macho 2º año** por tener la brida clara (excepto las que tienen aspecto de **macho**); dorso con tinte verdoso; la **hembra adulta** se separa de la **hembra de 2º año** por tener la punta blanco-amarillenta de las coberteras primarias más extensa (5-10 mm) y el listado de las partes inferiores más tenue.

Macho adulto inconfundible con plumaje corporal amarillo intenso; partes inferiores no listadas; brida negra; pluma central de la cola negra hasta la base o casi; plumas del ala negras; pluma más externa de la cola con amplia mancha amarilla en la punta (26-38 mm); coberteras primarias negras con amplia mancha amarilla en la punta (7-16 mm).



Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; centro hembra; abajo hembra con aspecto de macho.

15080 Oropéndola europea (*Oriolus oriolus*)




Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho; centro 2º año hembra; abajo 1º año.



Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho; abajo hembra.



Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Diseño de coberteras primarias: arriba 2º año macho; centro 2º año hembra; abajo 1º año.




Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Adulto. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho; centro hembra; abajo hembra con aspecto de macho.

Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Diseño de coberteras del ala: arriba 2º año macho; centro 2º año hembra; abajo 1º año.



Oropéndola. Determinación de la edad y el sexo. Adulto. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda macho; derecha hembra.



Oropéndola. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda 2º año; derecha 1º año.



Oropéndola. Determinación de la edad. Diseño del pecho: arriba adulto hembra; centro 2º año; abajo 1º año.



Oropéndola. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la pluma central de la cola: izquierda adulto/2º año; derecha juvenil/1º año.



Oropéndola. Adulto. Hembra (30-VI).



Oropéndola. 1º año (27-VIII).



Oropéndola. Adulto. Hembra con aspecto de macho (24-VI).



Oropéndola. Juvenil (22-VII).



Oropéndola. 2º año. Macho (19-V).



Oropéndola. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (24-VI); centro hembra (30-VI); abajo hembra con aspecto de macho (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra (22-VI).

15080 Oropéndola europea (*Oriolus oriolus*)



Oropéndola. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-V); abajo hembra (22-VI).



Oropéndola. Diseño de la cabeza: arriba 1º año (27-VIII); abajo juvenil (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra (30-VI); izquierda hembra con aspecto de macho (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (19-V); derecha hembra (22-VI).



Oropéndola. Diseño del pecho: izquierda 1º año (27-VIII); derecha juvenil (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra (30-VI); izquierda hembra con aspecto de macho (24-VI).

15080 Oropéndola europea (*Oriolus oriolus*)



Oropéndola. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (19-V); derecha hembra (22-VI).



Oropéndola. Diseño del dorso: izquierda 1º año (27-VIII); derecha juvenil (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Diseño de la cola y su pluma externa: arriba izquierda macho (22-VIII); arriba derecha hembra (30-VI); izquierda hembra con aspecto de macho (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Diseño de la cola y su pluma externa: arriba izquierda macho con todas las plumas mudadas (26-VI); arriba derecha macho con dos plumas externas retenidas (19-V); izquierda hembra (22-VI).



Oropéndola. Diseño de la cola y su pluma externa: izquierda 1º año (27-VIII); derecha juvenil (22-VII).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño del flanco (19-V).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño del flanco (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño del flanco (22-VI).



Oropéndola. Adulto. Hembra con aspecto de macho: diseño del flanco (24-VI).



Oropéndola. 1º año: diseño del flanco (27-VIII).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño del flanco (30-VI).



Oropéndola. Juvenil: diseño del flanco (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (19-V).



Oropéndola. Adulto. Hembra con aspecto de macho: diseño de coberteras primarias (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (22-VI).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (30-VI).



Oropéndola. 1º año: diseño de coberteras primarias (27-VIII).



Oropéndola. Juvenil: diseño de coberteras primarias (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño de secundarias con todas las plumas mudadas (24-VI).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño de secundarias con todas las plumas mudadas (24-VI).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño de secundarias con una pluma retenida (30-VI).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño de secundarias con dos plumas retenidas (17-VI).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño de secundarias con todas las plumas mudadas (19-V).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño de secundarias con una cobertera retenida (26-VI).



Oropéndola. 1º año: diseño de secundarias (27-VIII).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño de secundarias con todas las plumas mudadas (22-VI).



Oropéndola. Juvenil: diseño de secundarias (22-VII).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño del ala con todas las plumas mudadas (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño de secundarias con una pluma retenida (30-VI).



Oropéndola. Adulto. Macho: diseño del ala con dos secundarias retenidas (17-VI).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño del ala con todas las plumas mudadas (24-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño del ala con todas las plumas mudadas (22-VI).



Oropéndola. Adulto. Hembra: diseño del ala con una secundaria retenida (30-VI).



Oropéndola. 2º año. Hembra: diseño del ala con una secundaria retenida (30-VI).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño del ala con todas las plumas mudadas (19-V).



Oropéndola. 1º año: diseño del ala (27-VIII).



Oropéndola. 2º año. Macho: diseño del ala con una cobertera retenida (26-VI).



Oropéndola. Juvenil: diseño del ala (22-VII).