

15190

Alcaudón chico (*Lanius minor*)



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra (11-VII).

IDENTIFICACIÓN

19-21 cm. Dorso gris; partes inferiores con tinte rosado; cabeza gris, con antifaz negro que sube sobre la frente; ala oscura con mancha blanca en la base de las primarias.



Alcaudón chico. Diseño del ala, cabeza y frente.



ESPECIES SIMILARES

El **alcaudón real** tiene un aspecto muy parecido pero es de tamaño mayor, la mancha blanca del ala es menos extensa, tiene una ceja blanca y carece de mancha negra sobre la frente.

Alcaudón chico. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la frente: izquierda macho (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra.



Alcaudón real.



SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con frente, brida y auriculares de color negro azabache; negro de la frente extendiéndose bien en el pileo (10-17 mm desde la base del pico); pecho habitualmente con tinte salmón-rosado intenso. **Hembra** con mancha de la frente, brida y auriculares de color negro apagado, a veces con motas o manchas grises; negro de la frente menos extenso alcanzando 6-12 mm desde la base del pico; pecho habitualmente con tinte salmón-rosado poco intenso. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

CUIDADO: el color del pecho en **adultos** con algo de solapamiento. En **otoño**, después de la muda **postnupcial**, la datación del sexo es como en **primavera**, pero aunque unos pocos **machos** retienen la frente toda negra, la datación del sexo en muchos ejemplares es muy difícil, o imposible, debido a la abundancia de plumas grises en la frente.



EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; píleo y manto finamente barrados de oscuro; sin negro en la frente; lados del pecho y flancos finamente barrados de gris; grandes coberteras negras, con una fina línea blanca en el borde y la punta .

1º año con aspecto similar al de los juveniles, pero las plumas corporales mudadas sin barrado gris; plumas de vuelo y cola nuevas.

Adulto con plumaje desgastado; manto sin barrado, de color gris uniforme; con una banda negra en la frente; lados del pecho y flancos sin barrado gris; grandes coberteras negro uniforme.



Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil (Foto: Ralph Lösekrug).



Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño de la frente: izquierda adulto hembra; derecha juvenil (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en los lugares de reproducción abarcando plumas corporales, coberteras del ala y ocasionalmente terciarias. Muda **postjuvenil** parcial en julio-septiembre variable en extensión, incluyendo principalmente plumas corporales. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho ().




Alcaudón chico. Primavera. Juvenil ().



Alcaudón chico. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); centro hembra (11-VII); abajo juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil ().



Alcaudón chico. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (11-VII).



Alcaudón chico. Primavera. Juvenil: diseño del ala (25-VIII) (Foto (ligeramente modificada): Ralph Lösekruug).