



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra (11-VII).





### **IDENTIFICACIÓN**

19-21 cm. Dorso gris; partes inferiores con tinte rosado; cabeza gris, con antifaz negro que sube sobre la frente; ala oscura con mancha blanca en la base de las primarias.





Alcaudón chico. Diseño del ala, cabeza y frente.

### **ESPECIES SIMILARES**

El **alcaudón real** tiene un aspecto muy parecido pero es de tamaño mayor, la mancha blanca del ala es menos extensa, tiene una ceja blanca y carece de mancha negra sobre la frente.

Alcaudón chico. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la frente: izquierda macho (Foto: Reinhard Vohwinkel); derecha hembra.

### **SEXO**

En plumaje **nupcial**, **macho** con frente, brida y auriculares de color negro azabache; negro de la frente extendiéndose bien en el píleo (10-17 mm desde la base del pico); pecho habitualmente con tinte salmón rosado intenso. **Hembra** con mancha de la frente, brida y auriculares de color negro apagado, a veces con motas o manchas grises; negro de la frente menos extenso alcanzando 6-12 mm desde la base del pico; pecho habitualmente con tinte salmón-rosado poco intenso. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

CUIDADO: el color del pecho en adultos con algo de solapamiento. En otoño, después de la muda postnupcial, la datación del sexo es como en primavera, pero aunque unos pocos machos retienen la frente toda negra, la datación del sexo en muchos ejemplares es muy difícil, o imposible, debido a la abundancia de plumas grises en la frente.





http://www.aranzadi.eus



### **EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje nuevo; píleo y manto finamente barrados de oscuro; sin negro en la frente; lados del pecho y flancos finamente barrados de gris; grandes coberteras negras, con una fina línea blanca en el borde y la punta .

**1º año** con aspecto similar al de los **juveniles**, pero las plumas corporales mudadas sin barrado gris; plumas de vuelo y cola nuevas.

**Adulto** con plumaje desgastado; manto sin barrado, de color gris uniforme; con una banda negra en la frente; lados del pecho y flancos sin barrado gris; grandes coberteras negro uniforme.





Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño de la frente: izquierda adulto hembra; derecha juvenil (Foto: Reinhard Vohwinkel).



# FOTO NO DISPONIBLE

Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

### **MUDA**

Muda **postnupcial** parcial en los lugares de reproducción abarcando plumas corporales, coberteras del ala y ocasionalmente terciarias. Muda **postjuvenil** parcial en julio-septiembre variable en extensión, incluyendo principalmente plumas corporales. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.

### **FENOLOGÍA**



### FOTO NO DISPONIBLE

Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho ().

## FOTO NO DISPONIBLE


Alcaudón chico. Primavera. Juvenil ().







Alcaudón chico. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba macho (05 -V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); centro hembra (11-VII); abajo juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).









Alcaudón chico. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).















Alcaudón chico. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



## FOTO NO DISPONIBLE



## Alcaudón chico. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (); arriba derecha hembra (11-VII); izquierda juvenil ().



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (11-VII).



Alcaudón chico. Primavera. Juvenil: diseño del ala (25-VIII) (Foto: Reinhard Vohwinkel).

## FOTO N DISPONI



Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel).