

# 408 Urraca común

Pon tu logo aquí



Urraca. Adulto (01-I).

## URRACA COMÚN (*Pica pica*)

### IDENTIFICACIÓN

40-51 cm. (incluidos 16-20 de la cola). Plumaje negro y blanco con cola y ala verde brillante; cola muy larga.

### ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño en aves **adultas** puede ser un carácter útil en ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 198 mm; **hembra** con ala menor de 178 mm. **CUIDADO:** un número elevado de ejemplares no se pueden sexar debido al solapamiento en el tamaño.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:



**Juvenil** con plumaje nuevo; primarias 9ª y 10ª con una mancha oscura grande (más de 10 y 16 mm respectivamente); iris gris azulado; con una zona de piel desnuda de color gris azulado alrededor de los ojos.

**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las plumas brillantes cambiadas del ala y las coberteras primarias, álula y plumas de vuelo **juveniles** retenidas, que carecen de brillo; cola no mudada desgastada y sin brillo; primarias 9ª y 10ª como en los **juveniles**.

**Adulto** con plumaje con brillo iridiscente negro y verde en ala y cola, sin límites de muda; primarias 9ª y 10ª con una mancha oscura pequeña (menos de 13 y 15 mm respectivamente); iris oscuro; sin una zona de piel desnuda alrededor del ojo.




Urraca. Determinación de la edad. Diseño del iris y de la piel alrededor del ojo: arriba adulto; abajo juvenil.



Urraca. Determinación de la edad. Diseño de la mancha negra de las primarias 9ª y 10ª: arriba adulto; abajo juvenil.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas, medianas y algunas grandes coberteras internas (a veces todas); algunos ejemplares extienden su muda a algunas terciarias y el par central de plumas de la cola; habitualmente terminada en octubre.



Urraca. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

# 408 Urraca común

Pon tu logo aquí

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria. Muy ubiquista, está repartida por toda la comunidad faltando sólo en zonas de montaña no cultivadas o en las áreas muy deforestadas del Valle del Ebro.



Urraca. 2º año (07-I)



Urraca. Juvenil (13-VII)



Urraca. Pollo (11-VI)



Urraca.  
Color del iris: de arriba hacia abajo: adulto (01-I); 2º año (07-I); juvenil (08-VII); pollo (11-VI).

Urraca. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-I); derecha juvenil (29-VII)

**408 Urraca común**

Pon tu logo aquí




Urraca. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (01-I); arriba derecha 2° año (07-I); izquierda juvenil (08-VII)



Urraca. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (01-I); arriba derecha 2° año (07-I); izquierda juvenil (08-VII)

# 408 Urraca común


Pon tu logo aquí



Urraca. Adulto: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (08-III).




Urraca. Adulto: diseño del álula (08-III).



Urraca. 2º año: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (07-I).



Urraca. 2º año: diseño del álula (07-I).



Urraca. Juvenil: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (08-VII).



Urraca. Juvenil: diseño del álula (08-VII).



Urraca. Adulto: diseño del ala (08-III).

## 408 Urraca común

Pon tu logo aquí



Urraca. 2º año: diseño del ala (07-I).



Urraca. Juvenil: diseño del ala (08-VII).