

410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí



Chova piquigualda. Adulto (16-II)

CHOVA PIQUIGUALDA (*Pyrrhocorax graculus*)

IDENTIFICACIÓN

37-38 cm. Plumaje negro brillante uniforme; pico curvado; pico amarillo y patas de color rojo.



Chova piquigualda. Diseño del pico.

ESPECIES SIMILARES

Entre las aves de color negro es la única que tiene el pico de color amarillo. La **chova piquirroja** es parecida pero tiene el pico más largo y de color rojo.



Chova piquirroja

SEXO

No hay diferencias en cuanto al plumaje, aunque el tamaño puede ayudar a sexar a los ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 279 mm; **hembra** con ala menor de 250 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo, que es marrónáceo y sin brillo; patas oscuras con marcas anaranjadas; pico amarillo apagado; boca rosada y después amarilla .

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas corporales (y pequeñas coberteras si están cambiadas) brillantes y las juveniles de alas y cola sin brillo; plumas de vuelo y cola desgastadas; plumas de la cola puntiagudas; patas oscuras que se vuelven rojas en primavera; boca todavía amarilla en primavera.

Adultos con el plumaje negro brillante uniforme y poco desgastado (**CUIDADO:** algunos ejemplares pueden retener alguna cobertera alar o pluma de vuelo); plumas de la cola redondeadas; patas de rojo a naranja; boca negra.



Chova piquigualda. Determinación de la edad. Color del pico: arriba adulto; abajo juvenil.



Chova piquigualda. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí




Chova piquigualda. 2º año ()



Chova piquigualda. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a finales de octubre; algunos ejemplares pueden retener coberteras del ala o plumas de vuelo. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala; terminada a primeros de octubre.



Chova piquirroja. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares



Chova piquigualda. Juvenil ()

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año. Nidifica en las zonas más altas del Pirineo, bajando a altitudes menores en invierno.



Chova piquigualda. Diseño de la cabeza: arriba adulto (16-II); centro 2º año (); abajo juvenil ().



410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí



Chova piquigualda.
Diseño de las patas: arriba adulto (16-II); centro 2º año (); abajo juvenil ().



Chova piquigualda.
Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (16-II); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil ().



Chova piquigualda.
Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (16-II); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil ().



Chova piquigualda.
Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (16-II); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil ().

410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí



Chova piquigualda. Adulto: diseño del álula (16-II)



Chova piquigualda. Adulto: diseño de primarias (16-II)



Chova piquigualda. 2º año: diseño del álula ()



Chova piquigualda. 2º año: diseño de primarias ()



Chova piquigualda. Juvenil: diseño del álula ()



Chova piquigualda. Juvenil: diseño de primarias ()

410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí



Chova piquigualda. Adulto: diseño de secundarias (16-II)



Chova piquigualda. Adulto con una secundaria retenida: diseño de secundarias (16-II)

Chova piquigualda. Juvenil: diseño de secundarias ()



Chova piquigualda. Adulto: diseño del ala (16-II)



Chova piquigualda. Adulto con una secundaria retenida: diseño del ala (16-II)

Chova piquigualda. 2º año: diseño de secundarias ()

410 Chova piquigualda

Pon tu logo aquí



Chova piquigualda. 2º año: diseño del ala ()



Chova piquigualda. Juvenil: diseño del ala ()