

15670 **Corneja común** (*Corvus corone*)



Corneja común. Adulto (20-X).

IDENTIFICACIÓN

43-47 cm. Plumaje de color negro; cola cuadrada; pico y patas negras.



Corneja común. Diseño del pico y cola.

ESPECIES SIMILARES

Similar al **cuervo grande**, que es de tamaño mayor (51-63 cm) y cola "en cuña".



Cuervo grande.

SEXO

Plumaje de ambos sexos similar. El tamaño puede ayudar a sexar a los individuos extremos: **macho** con ala mayor de 335 mm.; **hembra** con ala menor de 300 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juvenil con plumaje nuevo; color negro sin brillo; interior de la mandíbula superior rosado.

1º año otoño/2º año primavera con plumas **juveniles** del ala y cola de color negro-marrón apagado contrastando con las plumas mudadas de color negro brillante; plumas de vuelo y cola desgastadas; interior de la mandíbula superior con zonas rosadas.

Adulto con el plumaje negro brillante y poco desgastado en alas y cola, sin límites de muda; interior de la mandíbula superior totalmente oscuro.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, todas las pequeñas y medianas coberteras, habitualmente algunas grandes coberteras internas (a veces de ninguna a todas) y a menudo el par central de plumas de la cola; algunos ejemplares extienden su muda a algunas terciarias; terminada en octubre.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Corneja común. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso

15670 **Corneja común** (*Corvus corone*)




Corneja común. 2º año (30-III).



Corneja común. Interior de la mandíbula superior: izquierda adulto (22-V); derecha 2º año (18-II).



Corneja común. Juvenil (18-VI).



Corneja común. Interior de la mandíbula superior: izquierda juvenil (18-VI); derecha pollo (12-VI).



Corneja común. Color del iris: arriba adulto (20-X); abajo 2º año (30-III).



Corneja común. Color del iris: arriba juvenil (18-VI); abajo pollo (12-VI).



Corneja común. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (31-III); arriba derecha 2ª año (30-III); izquierda juvenil (18-VI).

15670 **Corneja común** (*Corvus corone*)



Corneja común. Adulto: diseño del álula (20-X).



Corneja común. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (31-III); arriba derecha 2ª año (30-III); izquierda juvenil (18-VI).



Corneja común. 2º año: diseño del álula (30-III).



Corneja común. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (31-III); arriba derecha 2ª año (30-III); izquierda juvenil (18-VI).



Corneja común. Juvenil: diseño del álula (18-VI).



Corneja común. Adulto: diseño del ala (20-X).



Corneja común. 2º año: diseño del ala (30-III).



Corneja común. Juvenil: diseño del ala (18-VI).