

# 417a Identificación de estorninos

Pon tu logo aquí

## IDENTIFICACIÓN DE ESTORNINO PINTO (*Sturnus vulgaris*) Y ESTORNINO NEGRO (*Sturnus unicolor*)

### AVES NO JUVENILES

La fórmula alar y la longitud de la pluma más larga de la parte inferior de la garganta.



Estornino pinto. Fórmula alar: la 9ª primaria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales).



Estornino negro. Fórmula alar: la 8ª primaria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales).

Longitud de la pluma más larga de la parte inferior de la garganta (mm).

|                 | ♂ ad. | ♀ ad. | ♂ 1º año | ♀ 1º año |
|-----------------|-------|-------|----------|----------|
| Estornino pinto | 20-26 | 15-20 | 15-20    | 13-17    |
| Estornino negro | 28-41 | 21-27 | 24-28    | 17-23    |

### PRIMAVERA. MACHO ADULTO

Con algunas diferencias en el diseño del plumaje y moteado de las coberteras de la cola.



Estornino pinto. Adulto. Macho: con brillo metálico evidente, claramente dividido en verde y púrpura.



Estornino negro. Adulto. Macho: con brillo metálico suave, uniformemente coloreado de verde y púrpura.

**417a Identificación de estorninos**

Pon tu logo aquí





Estornino pinto. Adulto. Macho: sin moteado debido al desgaste pero al menos las supra e infracoberteras de la cola generalmente con algunas motas blancas.



Estornino negro. Adulto. Hembra: hembra adulta y aves de 2º año sin puntos claros en el plumaje corporal.



Estornino negro. Adulto. Macho: todo el plumaje sin moteado, incluso las infracoberteras de la cola.



Estornino pinto. Adulto. Hembra: hembra adulta y aves de 2º año con nítido y amplio moteado claro en supra e infracoberteras de la cola.

**PRIMAVERA. HEMBRA ADULTA Y AVES DE 2º AÑO**

Con algunas diferencias en el moteado de las plumas corporales y de las coberteras de la cola.



Estornino pinto. Adulto. Hembra: hembra adulta y aves de 2º año con algunos puntos claros en el plumaje corporal.



Estornino negro. 2º año. Macho: hembra adulta y aves de 2º año sin moteado en las supracoberteras de la cola; si las infracoberteras caudales tienen moteado entonces con motas muy pequeñas.




# 417a Identificación de estorninos

Pon tu logo aquí

## INVIERNO. TODAS LAS EDADES Y SEXOS

Diseño de las plumas del ala.




Estornino pinto. Plumas del ala con bordes anchos y nítidos.



Estornino negro. Plumas del ala con bordes estrechos.

## INVIERNO. TODAS LAS EDADES Y SEXOS

Con algunas diferencias en el diseño del plumaje y el moteado.



Estornino pinto. 1º año. Hembra: todas las edades y sexos con evidente brillo metálico verdoso; plumas corporales fuertemente moteadas.



Estornino negro. Adulto. Macho: con brillo metálico suave; todas las plumas sin motas.



Estornino negro. 1º año. Macho: hembra adulta y macho de 1º año con brillo metálico suave; moteado con motas claras muy pequeñas.




**417a Identificación de estorninos**


Pon tu logo aquí




Estornino negro. 1º año. Hembra: con poco brillo metálico; moteado intenso con motas claras muy pequeñas.



Estornino negro. Juvenil. Fórmula alar: la 8ª primaria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales).



Estornino pinto. Juvenil: ceja clara poco marcada (1); mejilla tintada de oscuro (2).



Estornino negro. Juvenil: ceja clara bien marcada (1); mejilla poco tintada de oscuro (2).



Estornino pinto. Juvenil. Fórmula alar: la 9ª primaria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales).