

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Verano. Adulto. Macho (16-V).

SERÍN VERDECILLO (*Serinus serinus*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido de pardo; vientre blanco, con estrías; obispillo amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente amarillas sin estrías en el **macho**, rayadas en la **hembra**.



Verdecillo. Diseño de ala, cabeza y cola.



Verderón



Lúgano. Hembra



Verderón serrano



ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos el **verderón** es de un tamaño mucho mayor (14-15 cm.); la hembra del **lúgano** tiene la banda del ala más ancha y amarillo en las plumas de la cola; el **verderón serrano** no tiene estrías en los flancos o, en los juveniles, son muy tenues.

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí

SEXO

Macho en **primavera** con frente, garganta y pecho amarillos y sin moteado; en **invierno** con plumas con puntas gris verdoso. **Hembra** con frente y pecho con moteado marrón; garganta de color amarillo verdoso. (**CUIDADO:** hay ejemplares intermedios (frente listada y garganta y pecho amarillos) que no se pueden sexar). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con aspecto parecido al de la **hembra**, pero es de color más ante claro; obispillo rayado; plumaje nuevo

1º año otoño/2º año primavera habitualmente con límite de muda entre grandes coberteras; si no han cambiado ninguna el límite está entre pequeñas y medianas coberteras; si todas las grandes coberteras están mudadas, entonces el límite está entre grandes coberteras y coberteras primarias, entre las plumas del álula, entre coberteras primarias, entre terciarias o entre terciarias y secundarias. Si ninguna pluma de la cola se ha cambiado, entonces todas con puntas agudas; si se ha cambiado alguna (habitualmente el par central) entonces con límite de muda entre las plumas cambiadas (redondeadas y nuevas) y las **juveniles** retenidas (puntiagudas y desgastadas) (**CUIDADO:** algunos ejemplares con muda extensa pueden cambiar todas las plumas de la cola).

(**CUIDADO:** algunos ejemplares tienen una muda **postjuvenil** completa)

Adulto/algunos postjuveniles con muda completa con las plumas de la cola (todas las plumas redondeadas) y ala de la misma generación.



Verdecillo. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.




Verdecillo. Determinación de la edad. Desgaste de la cola y diseño cobertoras caudales: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Verdecillo. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y habitualmente gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de plumas de la cola, si bien puede ser mudada toda la cola completa; generalmente terminada en octubre.



Verdecillo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibéndose migrantes europeos en invierno y con tendencia de la población local de desplazarse hacia el sur fuera de la época de cría. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las zonas deforestadas del alto Pirineo y de la Depresión del Ebro.

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Verano. Adulto. Hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Juvenil (06-VI).




Verdecillo. Verano. 2º año. Macho (16-V).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. 2º año. Hembra (16-V).



Verdecillo. Verano. Diseño de la cabeza: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Verano. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (16-V).


428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (16-V); abajo hembra (10-VI).

Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Diseño de las coberteras primarias: arriba 2º año macho (16-V); centro 2º año hembra (16-V); abajo juvenil (03-VII).



Verdecillo. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (06-VI).

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-VI).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Macho (10-X).



Verdecillo. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (06-VI).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra (30-IX).



Verdecillo. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (06-VI).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Macho (10-X).



Verdecillo. Verano. Juvenil: diseño del ala (06-VI).

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-IX).

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (10-X); arriba derecha hembra (10-X); izquierda hembra con muda extensa (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).

428 Serín verdecillo

Pon tu logo aquí



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda poco extensa (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda muy extensa (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-IX).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (10-X).