

# 430 Verderón común

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. Adulto. Macho (16-V).

## VERDERÓN COMÚN (*Chloris chloris*)

### IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Color verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola amarillos; **juveniles** más apagados y moteados en vientre y dorso



Verderón común.  
Diseño del ala,  
cabeza y cola.

### ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos, el **lúgano** y **verderón serrano** presentan amplias bandas amarillas en las alas; el **verdecillo** es de un tamaño mucho menor (11-12 cm.)



Verdecillo



Lúgano



Verderón serrano

### SEXO

**Macho** con la barba externa de las primarias 8ª a 6ª enteramente amarilla; el amarillo de las rectrices externas llega hasta el raquis; longitud de la mancha oscura en la punta de la 5ª pluma de la cola medida a lo largo del raquis menor de 31 mm; colores amarillos y verdes más intensos que en la **hembra**. **Hembra** con la barba externa de las primarias 8ª a 6ª con amarillo solo en la mitad exterior; el amarillo de las rectrices externas no llega hasta el raquis; longitud de la mancha oscura en la punta de la 5ª pluma de la cola medida a lo largo del raquis mayor de 31 mm; colores amarillos y verdes más apagados que en el **macho**. Los **juveniles** se pueden sexar utilizando los mismos caracteres de ala y cola que en **adultos**.

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Determinación del sexo. Diseño de cabeza y pecho: izquierda macho, derecha hembra.



Verderón común. Determinación del sexo. Diseño de primarias: arriba macho, abajo hembra.



Verderón común. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho, derecha hembra.



Verderón común. Determinación del sexo. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho, derecha hembra.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con aspecto parecido al de las **hembras**, pero con colores más apagados y moteado en el dorso y partes inferiores; plumaje nuevo.

**1º año otoño/2º año primavera** con plumas de la cola puntiagudas; si han mudado alguna, entonces con límite entre las plumas **juveniles** retenidas (puntiagudas y gastadas) y las mudadas (redondeadas y nuevas); generalmente con límite de muda entre grandes coberteras; si las han cambiado todas, entonces el límite está entre terciarias, entre plumas del álula o entre primarias renovadas de forma excéntrica; coberteras primarias con poco o nada de borde verde y sin punta gris.

**Adulto/postjuvenil con muda completa** sin límites de muda en la cola (todas las plumas redondeadas) y en el ala; coberteras primarias con borde verde y punta gris (más fácil de ver en **machos**).



Verderón común. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pecho: izquierda adulto hembra, derecha juvenil.

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pecho: izquierda adulto hembra, derecha juvenil.



Verderón común. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo 1º año.




Verderón común. Macho. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo 1º año.



**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y la mayor parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, ábula y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de plumas de la cola, si bien a veces puede ser mudada completamente; generalmente terminada en noviembre.



Verderón común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Presente todo el año, recibándose migrantes en invierno. Repartido por toda la Comunidad, falta únicamente en las zonas altas del Pirineo y áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. Adulto. Hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. Juvenil. Macho (12-VI).



Verderón común. Verano. 2º año. Macho (11-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. 2º año. Hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño de la cabeza: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).

# 430 Verderón común

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (10-VI).



Verderón común. Verano. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (16-V); abajo hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. 2º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (11-VI); abajo hembra (10-VI).

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. Juvenil. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (12-VI); abajo hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. Juvenil. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho (12-VI); abajo hembra (11-VI).



Verderón común. Verano. Adulto. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho (16-V); abajo hembra (03-VII).



Verderón común. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (16-V).



Verderón común. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (03-VII).



Verderón común. Verano. 2° año. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho (11-VI); abajo hembra (10-VI).



# 430 Verderón común

Pon tu logo aquí



Verderón común. Verano. 2º año Macho: diseño del ala (11-VI).



Verderón común. Invierno. Adulto. Macho (17-I).



Verderón común. Verano. 2º año Hembra: diseño del ala (02-VII).



Verderón común. Invierno. Adulto. Hembra (17-I).



Verderón común. Verano. Juvenil. Macho: diseño del ala (12-VI).



Verderón común. Invierno. 2º año. Macho (17-I).



Verderón común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño del ala (11-VI).

# 430 Verderón común

Pon tu logo aquí



Verderón común. Invierno. 2º año. Hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).

Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).

Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño de las plumas externas de la cola: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º. Diseño del dorso: izquierda macho (17-I); derecha hembra (17-I).

**430 Verderón común**

Pon tu logo aquí



Verderón común. Invierno. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (17-I); abajo hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho (17-I); abajo hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (17-I); abajo hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho (17-I); abajo hembra (17-I).



Verderón común. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (17-I).

## 430 Verderón común

Pon tu logo aquí



Verderón común. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Macho: diseño del ala (17-I).



Verderón común. Invierno. 2º año. Hembra: diseño del ala (17-I).