

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. Adulto. Macho (12-VI).

PARDILLO COMÚN (*Linaria cannabina*)**IDENTIFICACIÓN**

12-14 cm. Dorso pardo rojizo; **hembra** y **macho** en **invierno** con pecho rayado; **macho** en **verano** con pecho y frente rojas; blanco en ala y plumas externas de la cola.



Pardillo común. Diseño del ala, dorso y pecho: arriba macho en verano;: abajo hembra.

ESPECIES SIMILARES

La frente y pecho rojos hacen al **macho** inconfundible en **verano**. Con el resto de plumajes se reconoce sin dificultad por las líneas blancas en las primarias y dorso rojizo.

SEXO


Macho con el blanco de la barba externa de las primarias 1ª a 3ª alcanzando el raquis o quedando a menos de 0,5 mm; en **verano** con plumas rojas en la frente y pecho; en **invierno** con plumas con una mancha roja redondeada oculta por bordes ante (**CUIDADO:** estas manchas rojas pueden estar ocultas entre las plumas mostrando en una mirada superficial un pecho similar al de las **hembras**). **Hembra** con el blanco de la barba externa de las primarias 1ª a 3ª estando separado 0,5 mm o más del raquis; frente y pecho con un moteado oscuro, sin color rojo. Los **juveniles** se pueden sexar utilizando los mismos caracteres del ala que en **adultos**.



Pardillo común. Verano. Determinación del sexo. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.




Pardillo común. Verano. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.




Pardillo común. Invierno. Determinación del sexo. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Invierno. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Pardillo común. Determinación del sexo. Diseño de primarias internas: arriba macho; abajo hembra.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con el aspecto de la **hembra**, pero se reconocen por tener el plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras mudadas y retenidas; si han cambiado todas las grandes coberteras, entonces el límite está entre terciarias, entre plumas del álula y coberteras primarias o entre plumas de vuelo cambiadas; si las plumas centrales de la cola han sido mudadas, entonces con límite de muda entre las plumas cambiadas (redondeadas y nuevas) y **juveniles** retenidas (puntiagudas y desgastadas). **CUIDADO:** hay ejemplares que mudan todas las plumas de la cola y la extensión de la muda del ala es muy variable por lo que será necesario revisar todas las plumas.

Adulto/postjuvenil con muda completa sin límites de muda en la cola (todas las plumas redondeadas) ni en el ala.



Pardillo común. Verano. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año; izquierda juvenil.



Pardillo común. Invierno. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y la mayor parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, algunas coberteras primarias, terciarias o algunas plumas de vuelo, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de plumas de la cola, si bien puede ser mudada completamente; generalmente terminada en noviembre.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Pardillo común.
Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, con aporte de migrantes en invierno. Repartido por toda la Comunidad, falta únicamente en algunas zonas del Pirineo y Depresión del Ebro.



Pardillo común. Verano. Adulto. Hembra (11-VI).



Pardillo común. Verano. 2º año. Macho (18-VI).





Pardillo común. Verano. 2º año. Hembra (22-VI).

433 Pardillo común

Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. Juvenil. Macho (09-VI).



Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-VI); abajo hembra (22-VI).




Pardillo común. Verano. Juvenil. Hembra (12-VI).



Pardillo común. Verano. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (09-VI); abajo hembra (12-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (12-VI); abajo hembra (11-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (22-VI).



Pardillo común. Verano. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (09-VI); derecha hembra (12-VI).



Pardillo común. Verano. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (09-VI); derecha hembra (12-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).




Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (22-VI).




Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (22-VI).

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (09-VI); derecha hembra (12-VI).





Pardillo común. Verano. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (09-VI); derecha hembra (12-VI).




Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (12-VI); derecha hembra (11-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Diseño del color blanco en las primarias 1 a 3: arriba macho (12-VI); abajo hembra (11-VI).







Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (22-VI).



433 Pardillo común

Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (12-VI).

Pardillo común. Verano. 2º año. Diseño del color blanco en las primarias 1 a 3: arriba macho (18-VI); abajo hembra (22-VI).



Pardillo común. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (11-VI).



Pardillo común. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (18-VI).



Pardillo común. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (22-VI).



Pardillo común. Verano. Juvenil. Macho: diseño del ala (09-VI).

433 Pardillo común

Pon tu logo aquí



Pardillo común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño del ala (12-VI).



Pardillo común. Invierno. Adulto. Macho (21-XII).



Pardillo común. Invierno. Adulto. Hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Macho (21-XII).




Pardillo común. Invierno. 1º año. Macho con aspecto de hembra (21-XII).




Pardillo común. Invierno. 1º año. Hembra (21-XII).

433 Pardillo común

Pon tu logo aquí



Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (21-XII); arriba derecha macho con aspecto de hembra (21-XII); izquierda hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (21-XII); centro macho con aspecto de hembra (21-XII); abajo hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).




Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (21-XII); arriba derecha macho con aspecto de hembra (21-XII); izquierda hembra (21-XII).

433 Pardillo común


Pon tu logo aquí



Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).




Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).





Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (21-XII); derecha hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. Adulto. Diseño del color blanco en las primarias 1 a 3: arriba macho (21-XII); abajo hembra (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Diseño del color blanco en las primarias 1 a 3: arriba macho (21-XII); abajo hembra (21-XII).

433 Pardillo común

Pon tu logo aquí



Pardillo común. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (21-XII).



Pardillo común. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (21-XII).



Pardillo común. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (21-XII).