

432a Identificación de “fringílicos verdes” Pon tu logo aquí

IDENTIFICACIÓN DE “FRINGÍLIDOS VERDES” (GÉNEROS *Chloris*, *Serinus*, *Carduelis* y *Spinus*)

1 - Con manchas amarillas en las plumas de vuelo y cola 2

- Sin manchas amarillas en las plumas de vuelo y cola 5

2 - Con manchas amarillas en todas las plumas de vuelo 3

- Con manchas amarillas solo en primarias 4

3 - Píleo y pecho blanco-verdosos, con estriado oscuro; plumas de la cola con mancha amarilla solo en las barbas externas: jilguero lúgano, hembra (*Spinus spinus*)

- Con píleo oscuro; pecho amarillo sin estrías; plumas de la cola con amplia mancha amarilla: jilguero lúgano, macho (*Spinus spinus*)

4 - Las manchas amarillas en las primarias no alcanzan el raquis; plumas externas de la cola con mancha amarilla solo en la barba interna; pecho gris verdoso, sin estrías: verderón común, hembra (*Chloris chloris*)

- Las manchas amarillas en las primarias alcanzan el raquis; plumas externas de la cola con amplias manchas amarillas; pecho verdoso, sin estrías: verderón común, macho (*Chloris chloris*)

- Con alas y cola similar a las descritas pero con pecho estriado: verderón común, juvenil (*Chloris chloris*)

5 - Con pecho y flancos no estriados: verderón serrano, adulto (*Carduelis citrinella*)



- Con estrías en pecho y/o flancos 6

6 - Con pecho liso y flancos estriados: serín verdillo, macho (*Serinus serinus*)



- Con estrías en pecho y flancos 7

7 - Pecho con estriado oscuro; pico corto y ancho: serín verdillo, hembra/juvenil (*Serinus serinus*)

- Pecho con estriado oscuro suave; pico largo y delgado: verderón serrano, juvenil (*Carduelis citrinella*)




Jilguero lúgano. Hembra: con manchas amarillas en todas las plumas de vuelo (1); píleo (2) y pecho (3) estriados; plumas de la cola con mancha amarilla solo en las barbas externas (4); pico largo y puntiagudo (5).



Jilguero lúgano. Macho: con manchas amarillas en todas las plumas de vuelo (1); píleo oscuro (2); pecho amarillo sin estrías (3); plumas de la cola con amplia mancha amarilla (4); pico largo y puntiagudo (5).



432a Identificación de “fringílicos verdes”

Pon tu logo aquí



Verderón común. Juvenil: manchas amarillas solo en las primarias (1); pecho con estrías (2); pico fuerte en forma de cono (3).



Verderón común. Hembra: manchas amarillas solo en las primarias, que no alcanzan el raquis (1); plumas externas de la cola con mancha amarilla solo en la barba interna (2); pecho gris verdoso, sin estrías (3); pico fuerte en forma de cono (4).




Verderón serrano. Adulto: sin manchas amarillas en plumas de vuelo (1) y cola (2); flancos sin estrías (3).

Verderón común. Macho: manchas amarillas solo en las primarias, que alcanzan el raquis (1); plumas externas de la cola con mancha amarilla extensa (2); pecho verdoso, sin estrías (3); pico fuerte en forma de cono (4).


432a Identificación de “fringílicos verdes” Pon tu logo aquí



Serín verdecillo. Macho: sin manchas amarillas en plumas de vuelo (1) y cola (2); pecho sin estrías (3) y flancos con estrías (4).



Verderón serrano. Juvenil: sin manchas amarillas en plumas de vuelo (1) y cola (2); pecho con estriado oscuro suave (3); pico largo y delgado (4).



Serín verdecillo. Juvenil: sin manchas amarillas en plumas de vuelo (1) y cola (2); pecho con estriado oscuro (3); pico corto y ancho (4).