

439 Camachuelo común

Pon tu logo aquí



Camachuelo común. Macho (15-VII)

CAMACHUELO COMÚN (*Pyrrhula pyrrhula*)

IDENTIFICACIÓN

14-17 cm. **Macho** con píleo y mentón negros; dorso gris pizarra; obispillo blanco; alas oscuras con una barra alar blanca; mejilla y partes inferiores de color carmín. **Hembra** como el macho, pero con dorso de tonos pardos y partes inferiores gris asalmonado. **Juveniles** pardos, sin píleo negro.



Camachuelo común. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Macho con partes inferiores rojizas. **Hembra** con partes inferiores pardo grisáceo. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el plumaje.



Camachuelo común. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil sin píleo ni babero negro; plumaje muy nuevo.

1º año otoño/2º año primavera similares a los **adultos**, pero con límite de muda en el ala entre las grandes coberteras internas cambiadas, más oscuras y con puntas blancas, y las **juveniles** externas retenidas, pardas y con puntas ocre; como raramente mudan la pluma carpal, ésta es casi siempre **juvenil** con punta ocre.

Adulto con píleo y babero negros; plumas del ala de la misma generación, sin límites de muda; punta de la pluma carpal con punta blanca.

CUIDADO: en cualquier edad las 3 grandes coberteras más externas son más cortas y muestran bordes más estrechos que las internas, simulando un límite de muda.



Camachuelo común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



439 Camachuelo común

Pon tu logo aquí



Camachuelo común. Determinación de la edad. Diseño del píleo: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.




Camachuelo común. Determinación de la edad. Diseño de las grandes coberteras: izquierda adulto; derecha juvenil.



Camachuelo común. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre pero con ejemplares que la alargan hasta diciembre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y parte de las grandes coberteras; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras, terciarias y algunas secundarias internas; está terminada entre octubre y diciembre.



Camachuelo común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentario. Distribuido como nidificante sólo en los Pirineos, con presencia en partes más bajas en invierno.





Camachuelo común. Hembra (15-VII).

439 Camachuelo común

Pon tu logo aquí



Camachuelo común. Juvenil (15-VII)



Camachuelo común. Diseño del pileo: arriba izquierda macho (15-VII); arriba derecha hembra (15-VII); izquierda juvenil (15-VII).



Camachuelo común. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho (15-VII); arriba derecha hembra (15-VII); izquierda juvenil (15-VII).



Camachuelo común. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (15-VII); arriba derecha hembra (15-VII); izquierda juvenil (15-VII).



Camachuelo común. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (15-VII); arriba derecha hembra (15-VII); izquierda juvenil (15-VII).

439 Camachuelo común

Pon tu logo aquí




Camachuelo común. Verano. Adulto. Diseño y desgaste de la cola: izquierda macho (22-VII); derecha hembra (16-IV) (Foto: Madalen Goitia).



Camachuelo común. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda 2º año macho (15-VII); arriba derecha 2º año hembra (15-VII); izquierda juvenil (15-VII).



Camachuelo común. Verano. Adulto. Diseño del álula y cobertera carpal: arriba macho (22-VII); abajo hembra (16-IV) (Foto: Sergio de Juan).



Camachuelo común. Diseño del álula y cobertera carpal: arriba 2º año macho (15-VII); centro 2º año hembra (15-VII); abajo juvenil (15-VII).



Camachuelo común. Adulto. Macho: diseño del ala (22-VII).

439 Camachuelo común

Pon tu logo aquí



Camachuelo común. Adulto. Hembra: diseño del ala (16-IV) (Foto: Sergio de Juan).



Camachuelo común. Juvenil: diseño del ala (15-VII).



Camachuelo común. 2º año. Macho: diseño del ala (15-VII).



Camachuelo común. 2º año. Hembra: diseño del ala (15-VII).