

Collalba negra. Adulto. Macho (16-X).

COLLALBA NEGRA (Oenanthe leucura)

IDENTIFICACIÓN

17-19 cm. Cuerpo uniformemente negro (macho) o pardo oscuro (hembra); obispillo e infracoberteras caudales blancas; cola blanca con una banda central y terminal negra.



Collalba negra: diseño de pecho y cola.



ESPECIES SIMILARES

La combinación de cuerpo oscuro y cola blanca hacen a la especie inconfundible.

SEXO

Macho con plumas del cuerpo negras; ala mayor de 99 mm. Hembra con plumas del cuerpo pardo oscuro; ala menor de 95 mm. Los juveniles son parecidos a los adultos, por lo que se pueden sexar por el diseño del plumaje (CUIDADO: los colores en las aves juveniles son más apagados por lo que el sexado no es siempre posible en todos los ejemplares).





Collalba negra. Adulto. Determina ción del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

Collalba

mina

negra. Juve-

nil. Deter-

ción

sexo.









Collalba negra. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.





Collalba negra. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje suelto y muy nuevo en verano.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las plumas mudadas más oscuras (grandes coberteras y a veces terciarias) y las **juveniles** retenidas, más marrones y desgastadas.

Adulto con plumaje uniforme, sin límites de muda en el ala.



Collalba
negra. Determina ción
de la edad.
Diseño de la
cabeza y
pico: arriba
adulto hembra; abajo
juvenil hembra.









Collalba negra. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.





Collalba negra. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.





Collalba negra. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.





Collalba negra. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.






Collalba negra. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y grandes coberteras más internas; algunos ejemplares amplían la muda a todas las grandes coberteras, algunas o todas las terciarias y algunas plumas de la cola; suele estar terminada en octubre.



Collalba negra. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA



ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año. Repartida de forma discontinua por la Cordillera Ibérica y la Depresión del Ebro en lugares con los cortados que necesita la especie.



Collalba negra. Adulto. Hembra (16-X).



Collalba negra. 1º año. Macho (20-X).



Collalba negra. 1º año. Hembra (20-X).



Collalba negra. Juvenil. Macho (12-VII).





Collalba negra. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (09-XII); abajo hembra (20 -X).



Collalba negra. Juvenil. Hembra (12-VII).





Collalba negra. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (12-VII); abajo hembra (12-VII).





Collalba negra. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-X); abajo hembra (16-X).



Collalba negra. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-X); derecha hembra (16-X).





Collalba negra. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (20-X); derecha hembra (20-X).





Collalba negra. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (12-VII); derecha hembra (12-VII).





Collalba negra. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-X); derecha hembra (16-X).





Collalba negra. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (09-XII); derecha hembra (20-X).





Collalba negra. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (12-VII); derecha hembra (12-VII).





Collalba negra. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-X); derecha hembra (16-X).





Collalba negra. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (09-XII); derecha hembra (20-X).





Collalba negra. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (12-VII); derecha hembra (12-VII).



Collalba negra. Adulto. Macho: diseño del ala (16-X).



Collalba negra. Adulto. Hembra: diseño del ala (16-X).



Collalba negra. 1º año. Macho: diseño del ala (09-XII)



Collalba negra. 1º año. Hembra: diseño del ala (20-X).



Collalba negra. Juvenil. Macho: diseño del ala (12-VII).



Collalba negra. Juvenil. Hembra: diseño del ala (12-VII).