

# 09 Zampullín cuellinegro

Pon tu logo aquí

## ZAMPULLÍN CUELLINEGRO (*Podiceps nigricollis*)

### IDENTIFICACIÓN

28-34 cm. En plumaje **nupcial** con dorso, cabeza y cuello negros, con plumas doradas detrás de los ojos; flancos castaños; abdomen blanco. En plumaje **no nupcial** partes superiores oscuras; partes inferiores blanquecinas; cabeza negra sólo hasta los ojos.

### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie en Aragón.

### EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

**Juveniles** con partes superiores de color marrón claro, a menudo con matiz oliváceo; capirote y parte superior del cuello con tinte oliva; lados del cuello de color ante; escapulares generalmente con restos de plumón en la punta; iris marrón con tinte anaranjado.

**1º invierno** con aspecto similar al **adulto** pero partes superiores con plumas marrones **juveniles** mezcladas con las oscuras propias del **adulto**; al final del invierno todas las plumas marrones **juveniles** se han perdido pero están retenidas las coberteras del ala y escapulares.

**2º año primavera** con aspecto similar al **adulto**, pero con las plumas del capirote con un color negro más apagado y con algunas plumas marrones; coberteras del ala y primarias erosionadas y decoloradas por el desgaste; algunos ejemplares con iris naranja o naranja-rojizo.

**Adulto** en **invierno** con partes superiores negro uniforme: escapulares con puntas redondeadas y bien formadas; iris rojo brillante. En **primavera** con las plumas del capirote negro brillante y sin plumas marrones mezcladas; coberteras del ala y primarias con puntas poco desgastadas.

### SEXO

Sexos similares si bien en **plumaje nupcial**, **macho** generalmente con flancos de color ante más intenso y cresta más amarilla que la **hembra**. El tamaño puede ser útil en aves extremas: **macho** con longitud alar mayor de 136 mm, longitud del pico mayor de 27 mm. **Hembra** con longitud alar menor de 127 mm, longitud del pico menor de 21 mm.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas del cuerpo y cola; algunos ejemplares pueden retrasarla hasta diciembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** donde cambian las plumas de la cola y cuerpo adquiriendo el plumaje de cortejo.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año si bien en número muy pequeño. Es principalmente una especie reproductora con algunos ejemplares invernantes.