

73 Silbón europeo

Pon tu logo aquí

EDAD

Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con una variable cantidad de plumas **juveniles** retenidas en el cuerpo y alas; las grandes coberteras **juveniles** retenidas con punta estrecha; si se han retenido terciarias **juveniles**, entonces son estrechas, cortas y puntiagudas con un estrecho margen claro; algunas o todas las plumas de la cola pueden ser **juveniles** retenidas.

Adulto con grandes coberteras con punta ancha y cuadrada; terciarias largas y lanceoladas con las barbas externas negras con bien definidos bordes blancos o ante.

SILBÓN EUROPEO (*Anas penelope*)

IDENTIFICACIÓN

45-51 cm. **Macho** con cabeza y cuello castaños; píleo y frente de color crema-amarillo; dorso vermiculado de gris; abdomen blanco; infracoberteras de la cola negras; alas con banda blanca y espejuelo verde. **Hembra** de color pardo; cabeza sin píleo crema; partes superiores gris marrón; infracoberteras de la cola moteadas de oscuro; ala con espejuelo verde más apagado que en el **macho**.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Macho con cabeza y cuello rojizos; capirote y frente de color ante amarillo; mancha verdosa detrás del ojo; pecho gris rosado; infracoberteras de la cola de color negro; espejuelo verde brillante; ala con una banda blanca; barba externa de la secundaria más interna blanca con un estrecho margen negro. **Hembra** con cabeza y cuello pardos; capirote y frente sin color ante amarillo; sin mancha verdosa detrás del ojo; pecho ante; infracoberteras de la cola moteadas de oscuro; espejuelo verde apagado; ala sin una banda blanca; barba externa de la secundaria más interna teñida de gris.

No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje **no nupcial**.

MUDA

Desde octubre, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial adquiriendo el plumaje nupcial; durante el **invierno** las terciarias, cola y algunas plumas corporales están en muda activa.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

ESTATUS EN ARAGÓN

Invernante, con presencia muy escasa en cualquier punto de agua de la Comunidad.